



Alteplas intravenös inf 1 mg/mL

(Actilyse)

EN-STEGSSPÄDNING

Alteplas		Medföljande vätska		INF
10 mg				1 mg/mL
1 st	+	10 mL	=	10 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alteplas		Medföljande vätska		INF
20 mg				1 mg/mL
1 st	+	20 mL	=	20 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alteplas		Medföljande vätska		INF
50 mg				1 mg/mL
1 st	+	50 mL	=	50 mL

Beredningsinstruktion:

Rotera flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret. Skaka inte, eftersom det kan leda till skumbildning.

ADMINISTRERING

Intravenös infusion:

Låg dos: 6 - 72 timmar

Hög dos: 4 - 12 timmar

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

RIMLIG DOS för Alteplas intravenös inf 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,01 mg/kg/tim	-	-	0,1 mL/tim	0,5 mL/tim
0,06 mg/kg/tim	-	-	0,6 mL/tim	3 mL/tim
0,1 mg/kg/tim	-	-	1 mL/tim	5 mL/tim
0,6 mg/kg/tim	-	-	6 mL/tim	30 mL/tim

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandlingen bör alltid ske i samråd med koagulationsspecialist.

Systemisk trombolys

Alternativ 1: Hög dos

Barn: 0,1 - 0,6 mg/kg/tim, ges under 4 - 12 timmar.

Alternativ 2: Låg dos

Barn: 0,01 - 0,06 mg/kg/tim, max 2 mg/tim, ges under 6 - 72 timmar.

ÖVRIG INFORMATION

Överväg att ge färskfrusen plasma (FFP) 10 - 15 mL/kg inför trombolys för att säkerställa adekvat nivå av plasminogen, särskilt till barn under 1 år.

REFERENS/LÄNK

Micromedex

PubMed PMID Tarango C, Manco-Johnson MJ. Pediatric Thrombolysis: A Practical Approach.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29270396>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4478

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4478

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-07-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Alteplas intravenös inf 1 mg/mL

(Actilyse)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Alteplas (registrerad produkt)

10 mg, Pulver & vätska till inj/inf

Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen, ljuskänsligt. Gäller alla styrkor.

1 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Hållbar 8 tim i rumstemp, 24 tim i kylskåp.