



Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg

(ex Bioclavid) tablett

Används inte vid misstanke om mononukleos pga risk för erytem.

Förhållandet mellan amoxicillin och klavulansyra skiljer sig mellan olika preparat. Detta styr doseringen.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 875 + 125 mg (ex Bioclavid)

Amoxicillin + klavulansyra finns även som oral suspension, se annan instruktion.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner.

ADMINISTRERING

Vissa tabletter har brytskåra, det varierar mellan olika fabrikat. Tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljningen, men inte för att få två lika stora doser.

Bör administreras i början av en måltid för att minska risken för gastrointestinala biverkningar (ex illamående).

Oralt

Enteralt:

Oral suspension rekommenderas i första hand, se annan instruktion. Tablett kan dock krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen. Tänk på exponeringsrisken för antibiotikadamm. OBS - vid ofullständig krossning kan bitar av drageringen orsaka stopp i tunn sond.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Amoxicillin+Klavulansyra (registrerad produkt)

875 + 125 mg, Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Bör förvaras i originalförpackningen, vissa preparat är fukt känsliga och/eller ljuskänsliga (se produktresumé för produktspecifika uppgifter).

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Doserna nedan avser mängden AMOXICILLIN, 875 mg.

I FÖRSTA HAND rekommenderas DOSERING 3 GÅNGER DAGLIGEN, se annan instruktion. Denna styrka är dock ett alternativ till främst äldre barn då dosering 2 gånger dagligen är önskvärd (utan att dosen klavulansyra blir för hög).

I denna instruktion anges inte indikationsspecifika doseringar då källor för detta saknas.

Vid dosering som inte överensstämmer med tablettens styrka rekommenderas oral suspension 80 + 12 mg/mL, se annan instruktion.

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för amoxicillin och klavulansyra

Barn över 2 mån, under 40 kg: 12,5 - 22,5 mg/kg x 2, max 35 mg/kg x 2

Barn från 40 kg: 875 mg x 2, max 875 mg x 3

Behandlingstid: vanligen 5 - 10 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Förhållandet mellan amoxicillin och klavulansyra är 7:1 i denna tablett. Detta förhållande är lämpligt när man önskar dosera två gånger dagligen.

Det finns även tablett med styrkan 500 + 125 mg (4:1 förhållande). Den lämpar sig bättre för dosering tre gånger dagligen. Vid sväljsvårigheter finns oral suspension som alternativ. För dessa preparat, se andra instruktioner.

Vid GFR under 30 mL/min är det inte lämpligt att använda denna tablett (7:1 förhållande). I dessa fall är preparat med förhållandet 4:1 lämpligare, se andra instruktioner.





Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg

(ex Bioclavid) tablett

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompodium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompodium/>

PubMed PMID Navarro A S, New formulations of amoxicillin/clavulanic acid: a pharmacokinetic and pharmacodynamic review

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16231964>

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4480

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-02-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT