



## Flekainid oralt

(ex Tambocor) tablett/kapsel

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 100 mg (Tambocor)  
Kapsel i valfri styrka (extempore)

Till små barn och vid enteral administrering rekommenderas oral lösning, se annan instruktion.

### ADMINISTRERING

Tambocor tablett kan delas för att ge halv dos.  
Flekainid kan ges i samband med mat, dock ej med mejeriprodukter eftersom de kan minska läkemedelsupptaget.

Oralt

Enteralt: I första hand rekommenderas oral lösning, se annan instruktion.  
Kapslarna har laktos som fyllnadsmedel och kan öppnas och innehållet slammas upp i vatten direkt före administrering, se Övrig information.  
Tabletten kan lösas upp och ges enteralt.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Flekainid (registrerad produkt)

100 mg, Tablett

Förvaras i rumstemperatur.

#### Flekainid (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur. Hållbar 90 dagar från tillverkningsdatum.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandlingen ordineras i samråd med barnkardiolog.

Elektrolytrubbningar, speciellt hypo- eller hyperkalemi, bör korrigeras innan behandling påbörjas.  
Monitorera blodtryck, EKG (QRS- och QT-tid) dagligen vid insättning och eventuell doshöjning, samt S-flekainid vid behov.

#### För hjälp med beräkning av kroppsytta, se länk (klickbar):

<http://icd.internetmedicin.se/dos-yta>

#### Allvarlig ventrikulär takykardi (VT) och supraventrikulär takykardi (SVT)

De angivna doserna nedan är initiala doser.  
Optimalt terapivar nås efter 2 - 3 dagar. Steady-state nås efter 3 - 5 dagar, om patienten har normal njur- och leverfunktion.

Dosering baserat på kroppsvikt:

Nyfödda: 1 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år: 0,2 - 0,5 mg/kg x 3

Mål dygnsdos: 3 - 6 mg/kg/DYGN, max 8 mg/kg/DYGN.

Kliniska studier indikerar att doser över 8 mg/kg inte ger förbättrat behandlingsvar utan enbart ökad risk för biverkningar.

Dosering utifrån kroppsytta är att föredra för de minsta barnen för att undvika risk för överdosering.

Dosering baserad på kroppsytta:

Nyfödda: 35 - 50 mg/m<sup>2</sup> x 2

Barn 1 - 6 mån: 16,7 - 25 mg/m<sup>2</sup> x 2 - 3, max 200 mg/m<sup>2</sup>/DYGN

Barn från 6 mån: 33,3 - 50 mg/m<sup>2</sup> x 2 - 3, max 200 mg/m<sup>2</sup>/DYGN

Eventuell doshöjning bör ske med försiktighet, en gång var 4:e dag, och bedöms utifrån effekt och serumkoncentration.





## Flekainid oralt

(ex Tambocor) tablett/kapsel

### ÖVRIG INFORMATION

Flekainid metaboliseras till stor del via CYP2D6. Samtidig behandling med CYP2D6 hämmare (t.ex. propranolol, neuroleptika) leder till ökad plasmakoncentration av flekainid. Samtidigt behandling med CYP2D6 inducerare (t.ex. fenobarbital, karbamazepin) leder till minskad plasmakoncentration av flekainid.

Dosjustering av flekainid vid samtidig behandling och vid utsättning av dessa grupper rekommenderas för att minimera risk för biverkningar.

Flekainid ska användas med försiktighet till njursjuka barn, dosjustering rekommenderas.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

PubMed PMID Capponi G, Belli G, Giovannini M et. Al. Supraventricular tachycardias in the first year of life: what is the best pharmacological treatment? 24 years of experience in a single centre. BMC Cardiovasc Disord. 2021 Mar 15;21(1):137

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33722203>

PubMed PMID Perry JC, Garson A Jr. Flecainide acetate for treatment of tachyarrhythmias in children: review of world literature on efficacy, safety, and dosing. Am Heart J. 1992 Dec;124(6):1614-21

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1462922>

PubMed PMID Price JF, Kertesz NJ, et. al . Flecainide and sotalolol: a new combination therapy for refractory supraventricular tachycardia in children <1 year of age. J Am Coll Cardiol. 2002 Feb 6;39(3):517-20.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11823091>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4505](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4505)



## Flekainid oralt

(ex Tambocor) tablett/kapsel



### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4505

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2024-03-26

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**