



Naloxegol oralt

(Moventig) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 12,5 och 25 mg (Moventig)

ADMINISTRERING

Moventig ska tas på tom mage, minst 30 min före dagens första måltid eller 2 tim efter dagens första måltid. Bör tas på morgonen för att undvika tarmtömning nattetid.

Oralt: Vid sväljsvårigheter kan tabletten krossas och blandas i vatten. Tabletten saknar brytskåra.

Enteralt: kan ges i nasogastrisk sond (från 8 Fr) efter krossning och uppslamning i vatten.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Naloxegol (Moventig) (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Opioidinducerad förstoppning (bristande evidens)

Bör ordineras vid längre än 3 dagars opioidbehandling.

Barn 3 - 18 år:

Under 30 kg: 12,5 mg x 1 (på morgonen)

Från 30 kg: 25 mg x 1 (på morgonen)

ÖVRIG INFORMATION

Den nedre åldersgränsen i denna instruktion baseras främst på klinisk erfarenhet och praktisk hantering av tablett (saknar brytskåra).

REFERENS/LÄNK

ePed Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Gillett EL, et al. Naloxegol for Treatment of Opioid-Induced Constipation in the Pediatric Intensive Care Unit. Clin Pediatr (Phila). 2023

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36475875>

PubMed PMID Novak C et al. Peripherally acting μ -opioid receptor antagonists for treatment of opioid-induced constipation in children. Paediatr Child Health. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33747318>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4530

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-08-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT