



Magnesium intravenös inf/inj 0,5 mmol/mL

Doseras i mmol magnesium. Magnesium och kalcium ska monitoreras noggrant.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Magnesiumsulfat APL 123 mg/mL = 0,5 mmol/mL (extempore)
 Alt. 2 - 3: Spädning från Magnesium KONCENTRAT 1 mmol/mL (Addex-Magnesium eller Magneso Solfato 2,5 gram/10 mL = 1 mmol/mL (licens))

0,5 mmol/mL = 123 mg/mL magnesiumsulfatheptahydrat

INGEN SPÄDNING

Alt. 1 Färdigberedd lösning (extempore)

INF/INJ
0,5 mmol/mL
 35 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Magnesium KONCENTRAT 1 mmol/mL 5 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 5 mL	=	INF/INJ 0,5 mmol/mL 10 mL
---	---	---	---	--

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 3

Magnesium KONCENTRAT 1 mmol/mL 10 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 10 mL	=	INF/INJ 0,5 mmol/mL 20 mL
--	---	--	---	--

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Magnesium- och kalciumkoncentrationer ska monitoreras noggrant.
 Kontrollera reflexer regelbundet.

Måttlig/svår astmaexacerbation hos barn - tilläggsbehandling

Barn 1 mån - 18 år: (0,1 -) 0,16 - 0,2 mmol/kg
 Doser över 0,2 mmol/kg ger inte bättre effekt än lägre doser.
 Max 8 mmol/DOS

Kan upprepas 3 - 4 gånger med 4 - 6 timmars intervall första dygnet.

Hypomagnesemi

(inkl. hypokalcemi vid samtidig hypomagnesemi)

Intermittent

Nyfödda: 0,1 - 0,2 mmol/kg x 2 - 3

Vid allvarlig neonatal hypomagnesemi pga hypokalcemi
 0,2 - 0,4 mmol/kg x 1 - 2, totalt 2 - 3 doser.

Barn 1 mån - 18 år: 0,1 - 0,2 mmol/kg

Kan upprepas 2 - 4 gånger med 4 - 6 timmars intervall första dygnet.

Kontinuerlig infusion, intensivvård

Nyfödda: 0,0042 - 0,0083 mmol/kg/TIM = 0,1 - 0,2 mmol/kg/DYGN

Barn 1 mån - 18 år: 0,0042 - 0,0083 mmol/kg/TIM = 0,1 - 0,2 mmol/kg/DYGN

Persisterande pulmonell hypertension hos nyfödda (PPHN)

Nyfödda: Laddningsdos 0,8 mmol/kg

Därefter kontinuerlig infusion 0,08 - 0,3 mmol/kg/TIM =
 1,92 - 7,2 mmol/kg/DYGN i upp till 5 dygn.

Alternativt (låg evidens)

Nyfödda: 0,2 mmol/kg som engångsdos



Magnesium intravenös inf/inj 0,5 mmol/mL

ADMINISTRERING

Alt. AKUT: Intravenös injektion (3 -) 5 - 10 min, i undantagsfall, vid svåra tillstånd, t. ex. vid asystoli och astmaexacerbationer. Vid snabb injektion ökar risken för vasodilatation och hypotension, patienten bör därför övervakas.

Intravenös infusion:

Infusionstider varierar lokalt och beror på indikation/situation/allmäntillstånd:

Alt. 1: Intermittent infusion (vid ex arytm, astma, hypomagnesemi) 20 - 30 min

Alt. 2: Längre intermittent infusion (vid ex hypomagnesemi) 4 - 6 tim

Alt. 3: Laddningsdos 20 - 30 min följt av kontinuerlig infusion (vid ex arytm, hypomagnesemi, PPHN)

Alt. 4: Kontinuerlig infusion (vid ex hypomagnesemi)

I denna koncentration bör infusionen ges i central infart. Vid akutsituation och avsaknad av central infart kan infusionen ges perifert dock ej vid upprepade dostillfällen, se Övrig information.

RIMLIG DOS för Magnesium intravenös inf/inj 0,5 mmol/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,1 mmol/kg	0,2 mL	1 mL	2 mL	10 mL
0,25 mmol/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	25 mL
0,8 mmol/kg	1,6 mL	8 mL	-	-
0,1 mmol/kg/DYGN	-	0,04 mL/tim	0,08 mL/tim	0,42 mL/tim
0,8 mmol/kg/DYGN	0,07 mL/tim	0,33 mL/tim	0,66 mL/tim	3,3 mL/tim
1,92 mmol/kg/DYGN	0,16 mL/tim	0,8 mL/tim	-	-
Max 8 mmol (ex astma)	-	-	-	16 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Arytmi (Torsade de point)

Olika behandlingstraditioner förekommer. Dessa doser gäller för intensivvård. Behandlingen bör ske i samråd med barnkardiolog.

Nyfödda: 0,1 - 0,25 mmol/kg

Barn 1 mån - 18 år: 0,1 - 0,25 mmol/kg, max 8 mmol/DOS

Arytmi - tilläggsbehandling vid allvarlig arytm (låg evidens)

Olika behandlingstraditioner förekommer. Dessa doser gäller för intensivvård. Behandlingen bör ske i samråd med barnkardiolog.

Barn: Laddningsdos 0,25 mmol/kg

Om rytmen inte är återställd inom 10 min, bör en barnkardiolog konsulteras för fortsatt behandling.

Superrefraktär status epileptikus (låg evidens)

Barn 1 mån - 18 år:

Laddningsdos: 0,4 mmol/kg, max 8 mmol/DOS

Kontinuerlig infusion: 0,1 - 0,8 (- 2) mmol/kg/DYGN

Målvärde 2 mmol/L.





Magnesium intravenös inf/inj 0,5 mmol/mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Magnesium KONCENTRAT (från registrerad produkt)

1 mmol/mL, Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning

Oöppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning får ej sparas pga förväxlingsrisk. Gäller även licensprodukt.

0,5 mmol/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur. Alt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt SLS, se referens Hållbarhetsinformation. Gäller även licensprodukten.

Magnesiumsulfat APL (lagerberedning)

0,5 mmol/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

Oöppnad: hållbar 1 år från tillverkningsdatum vid högst 25 °C. Efter iordningsställande 12 tim i rumstemperatur. Alt kan infusion pågå i 24 tim efter iordningsställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt SLS, se referens Hållbarhetsinformation.

ÖVRIG INFORMATION

Hypomagnesemi och hypokalcemi förekommer ofta samtidigt.

Risk för respiratoriska och cirkulatoriska biverkningar vid höga magnesiumkoncentrationer. För patienter med neuromuskulära sjukdomar (ex. Duchennes muskeldystrofi) kan den neuromuskulära funktionen påverkas även vid låga magnesiumkoncentrationer, pga magnesiums muskelrelaxerade effekt.

Ingen minimiålder finns för behandling vid måttlig/svår astmaexacerbation hos barn, men i nuläget finns ingen klar indikation för små barn med bronkiolitbild (RS-virus, etc).

Flera parametrar styr möjligheten att administrera ett läkemedel perifert. Bland annat får inte osmolariteten överskrida ca 850 mOsm/kg. För magnesiumsulfat 0,5 mmol/mL iordningställd med NaCl blir osmolariteten ca 1150 mOsm/kg. Osmolariteten blir något lägre om spädningsvätskan är glukos. Upprepad perifer afministrering ökar risken för biverkningar, i huvudsak kärlskada. Vid akutsituation och avsaknad av central infart kan denna koncentration dock ges perifert vid enstaka dostillfällen.

Basbehovet av magnesium är vanligen 0,1 - 0,25 mmol/kg/DYGN.

Referensintervall P-Magnesium:

0 - 3 år: 0,77 - 0,96 mmol/L

4 - 18 år: 0,72 - 0,96 mmol/L

Vuxna: 0,7 - 0,95 mmol/L

Observera att magnesium har flera olika enheter. Dosering i mmol magnesium rekommenderas.

1 mmol magnesium (Mg²⁺)
= 24,3 mg magnesium (Mg²⁺)
= 250 mg magnesiumsulfatheptahydrat (MgSO₄:7H₂O)
= 2 mEq magnesium (Mg²⁺)





Magnesium intravenös inf/inj 0,5 mmol/mL

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok Akutpediatrikboken, åttonde upplagan

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Internetadress Medicines Complete - Martindale

<https://www.medicinescomplete.com/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Astma hos barn och vuxna
www.lakemedelsverket.se/astma

NeoFax

PubMed PMID Ho JJ and Rasa G. Magnesium sulfate for persistent pulmonary hypertension of the newborn.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17636807>

PubMed PMID Liu X et al. Optimizing the use of intravenous magnesium sulfate for acute asthma treatment in children.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27218606>

PubMed PMID Ridefelt P, et al. Pediatric reference intervals for general clinical chemistry components - merging of studies from Denmark and Sweden. Scand J Clin Lab Invest. 2018 Sep;78(5):365-372.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29806781>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi - Akut astma

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4565



Magnesium intravenös inf/inj 0,5 mmol/mL



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4565

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 10

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-01-28

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT