



Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 %

(Dextrogel) oral gel

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Dextrogel säljs som medicinteknisk produkt och licens behöver inte sökas för att hanteras på apotek. Dock rekommenderas att produkten hanteras som läkemedel på avdelningen för ordination, iordningställande, administrering och förvaring.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Buckalt: Använd handskar.

Dra upp dosen i enteral spruta. Torka kindslemhinnan med en kompress. Spruta ut glukosgelen på fingret och massera in i kindslemhinnan (ej längre än 3 minuter).

Vid större volym kan dosen behöva delas upp och masseras på båda sidorna.

RIMLIG DOS för Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 %

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mL/kg	0,5 mL	2,5 mL	-	-

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Dextrogel (medicinteknisk produkt)

40 %, Oral gel

HÅLLBAR: Tuber (25 g) kan inte återförslutas och kan därmed inte sparas efter öppnandet. Flaskor (80 g) har kork och får sparas 1 mån efter första uttag för infektionskänslig patient, annars 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypoglykemi

Nyfödda med gestationsålder minst 35 veckor: 0,5 mL/kg
Dosen kan upprepas efter 10 min, max 2 doser får ges.

Vikt 2 kg: 1 mL

Vikt 2,5 kg: 1,25 mL

Vikt 3 kg: 1,5 mL

Vikt 3,5 kg: 1,75 mL

Vikt 4 kg: 2 mL

Vikt 4,5 kg: 2,25 mL

Vikt 5 kg: 2,5 mL

Överväg därefter annan behandling om kvarstående hypoglykemi.

ÖVRIG INFORMATION

Tillhandahålls i tuber (25 g) eller flaskor (80 g). På förpackningen framgår inte gelens koncentration.

REFERENS/LÄNK

Internetadress British Association of Perinatal Medicine - Identification and Management of Neonatal Hypoglycaemia in the Full Term Infant – A Framework for Practice (2017)
<https://www.bapm.org/resources/40-identification-and-management-of-neonatal-hypoglycaemia-in-the-full-term-infant-2017>

Internetadress Produktinformation Dextrogel, Neoceuticals
<http://www.dextro-gel.co.uk/>

PubMed PMID Chandrasekharan P. and Lakshminrusimha S. The effectiveness of oral dextrose gel for the treatment of neonatal hypoglycaemia remains unclear
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28601799>

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Hypoglykemi vårdprogram
<http://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varldprogram/>



Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (Dextrojel) oral gel



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-10-26

ePedID: 4585

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-10-27

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-10-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT