



## Desloratadin oralt 0,5 mg/mL

(ex Aeries) oral lösning

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Effekten kommer efter ca 30 - 45 min.

Oralt

Enteralt i sond

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Desloratadin (ex Aeries) (registrerad produkt)

0,5 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Får ej frysas. Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Begränsad allergisk reaktion eller anafylaxi, grad 1

Då dessa doser är dubbelt så höga mot de i FASS angivna bör recept markeras med OBS

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Barn 1 mån - 5 år: 2,5 mg | (5 mL)  |
| Barn 6 - 11 år: 5 mg      | (10 mL) |
| Barn 12 - 18 år: 10 mg    | (20 mL) |

#### Symtomatisk behandling av allergi (rinit, urtikaria)

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Barn 6 - 11 mån: 1 mg x 1  | (2 mL)   |
| Barn 1 - 5 år: 1,25 mg x 1 | (2,5 mL) |
| Barn 6 - 11 år: 2,5 mg x 1 | (5 mL)   |
| Barn 12 - 18 år: 5 mg x 1  | (10 mL)  |

#### Kronisk idiopatisk urtikaria

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Barn 6 - 11 mån: 1 mg x 1  | (2 mL)   |
| Barn 1 - 5 år: 1,25 mg x 1 | (2,5 mL) |
| Barn 6 - 11 år: 2,5 mg x 1 | (5 mL)   |
| Barn 12 - 18 år: 5 mg x 1  | (10 mL)  |

Dosen ovan kan behöva höjas, undantagsvis ända upp till 3 - 4 gånger.

### ÖVRIG INFORMATION

Patienten bör observeras i minst 1 tim vid begränsad allergisk reaktion och 4 tim vid anafylaxi, grad 1.

Oral lösning innehåller propylenglykol, 100 mg/mL.

Detta innebär vid en dos om 1 mg (2 mL) 200 mg propylenglykol.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten anger följande gränsvärden (maximal daglig dos som hjälpämne i läkemedel) för propylenglykol:

Nyfödda (prematurt födda och fullgångna): 1 mg/kg

Barn 1 mån - 4 år: 50 mg/kg

Barn 5 - 18 år: 500 mg/kg



## Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aeries) oral lösning



### REFERENS/LÄNK

European Medicines Agency (EMA) Background review for the excipient propylene glycol  
[http://www.ema.europa.eu/docs/en\\_GB/document\\_library/Report/2014/12/WC500177937.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2014/12/WC500177937.pdf)  
FASS  
<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>  
Rekommendation , (Grade 1C)  
[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)  
Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer  
Allergi - Anafylaxi/anafylaktisk reaktion (D1)  
<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>  
Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer  
Allergi - Urticaria och angioödem (D5)  
<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst  
[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4593](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4593)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-11-11  
Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-11-12  
Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

ePedID: 4593  
Versionsnummer, major: 2  
Giltig fr o m: 2020-11-12

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**