



Desloratadin oralt

(ex Aeries) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Munsönderfallande tablett 2,5 mg resp. 5 mg (ex Caredin)
Tablett 5 mg (ex Aeries)

Vid doser under 2,5 mg och vid administrering i sond rekommenderas oral lösning, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Effekten kommer efter ca 30 - 45 min.

Oralt: Tabletter och munsönderfallande tabletter bör inte delas.

Enteralt i sond: Använd oral lösning för administrering i sond, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Desloratadin (ex Aeries) (registrerad produkt)

2,5 mg, Munsönderfallande tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen.
Fuktkänsligt. Gäller även 5 mg.

5 mg, Filmragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen.
Fuktkänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Begränsad allergisk reaktion eller anafylaxi, grad 1

Då dessa doser är dubbelt så höga mot de i FASS angivna bör recept markeras med OBS

Barn 1 mån - 5 år: 2,5 mg

Barn 6 - 11 år: 5 mg

Barn 12 - 18 år: 10 mg

Symtomatisk behandling av allergi (rinit, urtikaria)

Barn 6 - 11 mån: 1 mg x 1

Barn 1 - 5 år: 1,25 mg x 1

Barn 6 - 11 år: 2,5 mg x 1

Barn 12 - 18 år: 5 mg x 1

Kronisk idiopatisk urtikaria

Barn 6 - 11 mån: 1 mg x 1

Barn 1 - 5 år: 1,25 mg x 1

Barn 6 - 11 år: 2,5 mg x 1

Barn 12 - 18 år: 5 mg x 1

Dosen ovan kan behöva höjas, undantagsvis ända upp till 3 - 4 gånger.

ÖVRIG INFORMATION

Patienten bör observeras i minst 1 tim vid begränsad allergisk reaktion och 4 tim vid anafylaxi, grad 1.





Desloratadin oralt

(ex Aeries) tabletter

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi - Anafylaxi/anafylaktisk reaktion (D1)

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi - Urticaria och angioödem (D5)

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4594

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-11-11

ePedID: 4594

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-11-12

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-11-12

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT