



## Desloratadin oralt

(ex Aeries) tabletter

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Munsönderfallande tablett 2,5 mg resp. 5 mg (ex Caredin)

Tablett 5 mg (ex Aeries)

Vid doser under 2,5 mg, sväljsvårigheter och enteral administrering rekommenderas oral lösning, se annan instruktion.

### ADMINISTRERING

Effekten kommer efter ca 30 - 45 min.

Oralt: Tabletter och munsönderfallande tabletter bör inte delas.

Enteralt: Användning av oral lösning rekommenderas, se annan instruktion.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Desloratadin (registrerad produkt)

Munsönderfallande tablett

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänslig. Gäller båda styrkorna.

5 mg, Filmdragerad tablett

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Begränsad allergisk reaktion eller anafylaxi, grad 1

Då dessa doser är dubbelt så höga, och åldersintervallen lägre mot de i produktresumén angivna bör recept markeras med OBS.

Barn 1 mån - 5 år: 2,5 mg

Barn 6 - 11 år: 5 mg

Barn 12 - 18 år: 10 mg

#### Symtomatisk behandling av allergi (rinit, urtikaria)

Barn 6 - 11 mån: 1 mg x 1

Barn 1 - 5 år: 1,25 mg x 1

Barn 6 - 11 år: 2,5 mg x 1

Barn 12 - 18 år: 5 mg x 1

#### Kronisk idiopatisk urtikaria

Barn 6 - 11 mån: 1 mg x 1

Barn 1 - 5 år: 1,25 mg x 1

Barn 6 - 11 år: 2,5 mg x 1

Barn 12 - 18 år: 5 mg x 1

Dosen ovan kan behöva höjas, undantagsvis ända upp till 3 - 4 gånger. Kontakt med barnallergispecialist rekommenderas i dessa fall.

### ÖVRIG INFORMATION

Det finns begränsad evidens för doser till de mindre barnen.





## Desloratadin oralt

(ex Aeries) tabletter

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Chronic spontaneous urticaria in children - a systematic review on interventions and comorbidities. Cornillier et al. 2018

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29392757>

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi - Urtikaria och angioödem

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Anafylaxi

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

---

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4594](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4594)

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4594

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2026-01-20

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**