



Droperidol intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL

(ex Dridol)

EN-STEGSSPÄDNING

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| Droperidol 2,5 mg/mL 1 mL | + | NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 9 mL | = | INJ LÖ 0,25 mg/mL 10 mL |
|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|

ADMINISTRERING

Intravenös injektion: 2 - 5 min

Ges 30 min före förväntat operationsslut.

RIMLIG DOS för Droperidol intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL

| | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|-----------------|------|------|--------|-------|
| 10 mikrog/kg | - | - | 0,4 mL | 2 mL |
| 15 mikrog/kg | - | - | 0,6 mL | 3 mL |
| Max 1,25 mg/DOS | - | - | - | 5 mL |

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Droperidol (registrerad produkt)

2,5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Bruten ampull får ej sparas.

0,25 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax och behandling av postoperativt illamående och kräkningar (PONV), inte förstahandsval

Barn 2 - 18 år: 10 - 15 (- 30) MIKROG/kg = 0,01 - 0,015 (- 0,03) mg/kg
Max 1,25 mg/DOS

Dosen kan upprepas var 6:e timme vid behov.

Denna dos är lägre än den i t ex Fass, men studier och erfarenhet har visat att lägre dos ofta är tillräckligt.

ÖVRIG INFORMATION

Droperidol är ett neuroleptikum som blockerar dopaminreceptorer i kemotriggerzonen.

Kontraindicerat vid hypokalemi eller hypomagnesi, bradykardi och svår depression.
Risk för QT-förlängning vid elektrolytrubbning.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

PubMed PMID Gan TJ et al: Fourth Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting Anesth Analg 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32467512>

PubMed PMID Höhne C. Postoperative nausea and vomiting in pediatric anesthesia. Curr Opin Anaesthesiol 2014

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24722005>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>



Droperidol intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL

(ex Dridol)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4624

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-10-23

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT