



Lorazepam oralt/sublinguallt 1 mg

(ex Temesta) tablett/munsönderfallande tablett/resoriblett

Risk för andningsdepression och sedering. Förhöjd risk vid samtidig opioidbehandling. Även risk för paradoxala reaktioner.

Risk för tillvänjning.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett (ex Temesta)
Munsönderfallande tablett (ex Temesta Expidet licens)
Resoriblett (ex Lorazepam sublingual licens)

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering.
Munsönderfallande tabletten kan lösas upp i vatten för omedelbar administrering

Sublinguallt: Resoribletten placeras under tungan och ska ligga kvar tills den lösts upp helt.
Förtäring av mat eller dryck bör undvikas innan resoribletten har lösts upp fullständigt.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Lorazepam (registrerad produkt)

1 mg, Tablett

Förvaras i originalförpackningen vid högst 25 °C.

Lorazepam. (licensprodukt)

1 mg, Munsönderfallande tablett

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt och ljuskänsligt.

1 mg, Resoriblett, sublingual

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt och ljuskänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Katatoni (off-label)

Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas.

Behandling ska inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Barn 12 - 18 år: 1 - 2 mg x 2 - 6

ÖVRIG INFORMATION

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande läkemedel bör generellt undvikas som sederande läkemedel. Det föreligger risk för tolerans och beroendeutveckling.

Antidot: flumazenil (f.d Lanexat). OBS - flumazenil är olämpligt att ge till patient med epilepsi/kramper då den plötsliga antagonistiska effekten i sig kan orsaka kramper.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Ahmet Unal et al. The use of lorazepam and electroconvulsive therapy in the treatment of catatonia: treatment characteristics and outcomes in 60 patients.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28640169>

PubMed PMID Kendrick JG. Pharmacologic Management of Agitation and Aggression in a Pediatric Emergency Department - A Retrospective Cohort Study

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30697130>

PubMed PMID Sienaert P. et al. A clinical review of the treatment of catatonia

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25538636>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4643





Lorazepam oralt/sublinguallt 1 mg

(ex Temesta) tablett/munsönderfallande tablett/resoriblett

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4643

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-03-26

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT