



# Natriumcitrat + Natriumlaurylsulfoacetat rektalt (Microlax)

## ADMINISTRERING

Rektalt:

Bör värmas till kroppstemperatur i ett vattenbad före administrering. Fukta tubspetsen med en droppe av innehållet alternativt använd glidslem eller vitt vaselin.

Till barn under 3 år införs tubspetsen till cirka halva längden, se markering.

Efter administrering dras tuben ut fortfarande ihopklämd.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

**Microlax (registrerad produkt)**

Rektallösning

Förvaras vid högst 25 °C.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Tillfällig obstipation

Ges ofta som tilläggsbehandling till oralt laxantia.

Barn 1 mån - 18 år: 1 klyзма vid behov

Till barn under 3 år införs tubspetsen till cirka halva längden, se markering.

Vid biverkningar i form av sveda eller smärta i ändtarmen rekommenderas byte till sorbitol (långrest 2026) eller natriumdokusat + sorbitol, se annan instruktion.

## REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovård - Förstoppning

<https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/buk---oversikt/forstoppning/>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - Funktionell obstipation hos barn och ungdomar. Nationellt vårdprogram

<https://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/>

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4646

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2026-03-10

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**