



## Fytomenadion intravenös inj 1 mg/mL

(Vitamin K, Konakion Novum)

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av injektionslösning Konakion Novum 10 mg/mL

Konakion Novum 10 mg/mL kan även ges outspätt, se annan instruktion.

### EN-STEGSSPÄDNING

Fytomenadion 10 mg/mL 1 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 9 mL	=	INJ LÖ <b>1 mg/mL</b> 10 mL
----------------------------------	---	---	---	-----------------------------------

#### Beredningsinstruktion:

Lösningen i ampullen ska vara klar. Om den är grumlig eller om fas-separation skett ska ampullen kasseras.

Glukos rekommenderas i första hand som spädningssvätska, se Övrig information.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion:

Ges under minst 30 sek.

### RIMLIG DOS för Fytomenadion intravenös inj 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/DOS	0,5 mL	-	-	-
1 mg/DOS	-	1 mL	-	-
0,3 mg/kg, max 10 mg	0,3 mL	1,5 mL	3 mL	10 mL
1 mg/kg, max 10 mg	1 mL	5 mL	10 mL	10 mL

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Fytomenadion (registrerad produkt)

10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemp i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 12 tim i rumstemperatur, skyddas mot ljus.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Förebyggande av vitamin K-beroende blödning hos nyfödda

Prematurfödda med födelsevikt under 1,5 kg: 0,5 mg, engångsdos

Fullgångna nyfödda samt prematurfödda med födelsevikt från 1,5 kg:  
1 mg, engångsdos

Engångsdosen kan även ges intramuskulärt med outspädd injektionslösning 10 mg/mL, se annan instruktion.

#### Förvärvad vitamin K-brist, inkl. vid leversjukdom, neonatal kolestas, neonatal hypoprotrombinemi samt vid massiv blödning

Nyfödda: 0,3 - 1 mg/kg x 1

Barn 1 mån - 18 år: 0,3 - 1 mg/kg x 1, max 10 mg/DOS

Vid blödning ges engångsdos, som kan upprepas vid behov.

Av tradition används dosen 1 mg/kg vanligen till leversjuka barn.

#### Reversering av allvarlig blödning sekundär till warfarin/antivitamin-K behandling

Barn 1 mån - 18 år: 0,3 mg/kg, max 10 mg/DOS

Dosen kan upprepas vid behov.

### ÖVRIG INFORMATION

Effekt ses 1 - 3 tim efter intravenös administrering.

Enligt svensk produktresumé ska endast glukos 50 mg/mL användas som spädningssvätska. Enligt företaget är dock Konakion Novum kompatibelt med NaCl 9 mg/mL och båda spädningssvätskorna finns som alternativ i t.ex. Martindale. Företaget rekommenderar glukos i första hand då det bl.a. ger bättre klarhetsegenskaper.





## Fytomenadion intravenös inj 1 mg/mL

(Vitamin K, Konakion Novum)

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH), Hemostas vid allvarlig blödning

<http://www.ssth.se/lankar>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Nationella riktlinjer för vitamin K profylax

<http://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varldprogram/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4678](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4678)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingeha Rydén 2019-09-02

ePedID: 4678

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-09-03

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-09-03

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**