



## Makrogol + elektrolyter oralt

(ex Movicol Junior Neutral) barn under 6 mån

**Makrogol rekommenderas egentligen inte till spädbarn pga kraftfull osmotisk effekt som kan leda till salt- och vätskeförlust.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Dosering av makrogol ex. Movicol Junior Neutral till barn under 6 mån. Information från denna instruktion finns även med på ePedID 2733.

### ADMINISTRERING

Pulvret ska lösas i vatten innan administrering, alternativt strös på lite mat.

Viktigt att skaka påsen innan iordningställande då endast del av dospåsen ska användas.

Oralt

Enteralt

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### ex Movicol Junior Neutral (registrerad produkt)

Pulver till oral lösning, dospåse

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad påse kan förvaras i skydd för fukt i max 1 vecka.

Oral lösning

HÅLLBAR: Iordningställd lösning kan förvaras övertäckt i kylskåp max 24 timmar.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Obstipation hos nyfödda och barn under 6 mån (låg evidens)

Till barn under 6 mån rekommenderas i första hand behandling med laktulos.

Nyfödda: 0,7 g/kg x 1

Barn 1 - 5 mån: 0,7 g/kg x 1

Få studier finns. Befintliga studier för barn över 1 månad har använt 0,7 g/kg x 1.

Vid behov kan dosen mätas upp med kryddmått. 1 kryddmått = 1 mL = 0,7 g

Behandlingen bör omprövas var 3:e månad.

### ÖVRIG INFORMATION

1 kryddmått väger 0,7 g, gäller för Movicol Junior Neutral och Laxido Junior.

### REFERENS/LÄNK

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovård - Förstoppning

<https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/buk/forstoppning/>

PubMed PMID Gordon M. et al. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Aug 17;(8)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27531591>

PubMed PMID Loening-Baucke V. et al. Polyethylene glycol 3350 without electrolytes for the treatment of functional constipation in infants and toddlers. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2004 Nov;39(5):536-9.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15572895>

PubMed PMID Michail S. et al. Polyethylene glycol for constipation in children younger than eighteen months old. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2004 Aug;39(2):197-9.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15269628>

Rekommendation , (Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - Funktionell obstipation hos barn och ungdomar. Regionalt vårdprogram från Region Stockholm

<https://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/>



## Makrogol + elektrolyter oralt

(ex Movicol Junior Neutral) barn under 6 mån



---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-06-15

ePedID: 4695

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-06-23

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2021-06-23

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**