



Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL

(ex Nezeril) näsdroppar/nässpray

Spädning från olika utgångskoncentrationer.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

- Alt. 1: Näsdroppar, endosbehållare 0,25 mg/mL (Nezeril)
 Nässpray, lösning 0,25 mg/mL (ex Nezeril)
 Alt. 2: Spädning av Nezeril endosbehållare 0,5 mg/mL (Vid rest av endosbehållare och nässpray 0,25 mg/mL)
 Alt. 3: Spädning av Nezeril nässpray 0,5 mg/mL (vid rest av endosbehållare 0,5 mg/mL).

För yngre barn finns licenspreparat 0,1 mg/mL eller så kan spädning ske från övriga koncentrationer, se annan instruktion.

INGEN SPÄDNING

NÄSDR LÖ END
0,25 mg/mL
 0,1 mL

INGEN SPÄDNING

NÄSSPRAY
0,25 mg/mL
 7,5 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2 Spädning av endosbehållare 0,5 mg/mL

Oximetazolin		NaCl 9 mg/mL		NÄSDR LÖ END
0,5 mg/mL				0,25 mg/mL
0,1 mL	+	0,1 mL	=	0,2 mL

Beredningsinstruktion:

Tillsätt 0,1 mL NaCl 9 mg/mL direkt i endosbehållaren med Nezeril 0,5 mg/mL alternativt tom endosbehållarens innehåll (0,1 mL) i en medicinkopp, tillsätt 0,1 mL mängd NaCl 9 mg/mL och sug sedan upp blandningen i den tomma endospipetten och administrera från den.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Avsvällande vid nästäppa

Barn 2 - 6 år:
2 droppar eller 1 sprayning i vardera näsborren x 2 - 3

Barn 7 - 10 år:
0,1 mL eller 2 sprayningar i vardera näsborren x 2 - 3

Används högst 10 dagar i rad, kan annars ge läkemedelsrelaterad nästäppa.

ÖVRIG INFORMATION

Nasin nässpray innehåller konserveringsmedel som kan verka irriterande på nässlemhinnan.

Till yngre barn eller vid kvarstående besvär efter 10 dagar kan koksaltlösning användas.

REFERENS/LÄNK

FASS
<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>
 Internetadress FDA - Biverkningsrapport
<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm325257.htm>
 Internetadress MHRA - Overview, Risk: benefit of OTC cough and cold medicines in children
<http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-p/documents/websiteresources/con041374.pdf>
 Rekommendation , (Grade 2C)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman	ePedID: 4718
Fastställare/läkare: Charlotte Höglund	Versionsnummer, major: 2
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt	Giltig fr o m: 2022-12-07

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL

(ex Nezeril) näsdroppar/nässpray

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 3 Spädning av nässpray 0,5 mg/mL

Oximetazolin	NaCl 9 mg/mL		NÄSDR LÖ END
0,5 mg/mL		+	0,25 mg/mL
0,1 mL	0,1 mL	=	0,2 mL

Beredningsinstruktion:

Tillsätt 0,1 mL oximetazolin 0,5 mg/mL till en 1-mL spruta med kork från Nezeril nässpray genom att spraya ner i sprutan (spraya några gånger i luften innan för att fylla röret i Nezerilflaskan för att kunna vinkla sprayen och lättare spraya in i sprutan).

Addera 0,1 mL NaCl 9 mg/mL till 1-mL sprutan innehållandes 0,1 mL oximetazolin.

OBS! Det kan vara svårt att få exakt volym av nässprayen ned i sprutan.

ADMINISTRERING

Nasalt:

Innan användning av näsdropparna bör barnets näsa rengöras från snor. Efter att näsdropparna har administrerats i vardera näsborren bör barnet, om möjligt, sniffa in luft ett par gånger för att sprida läkemedlet i nässlemhinnan.

Vid användning av nässpray (flaska) ska sprayflaskan laddas innan första användning genom att hålla flaskan i upprätt läge och spraya några gånger i luften. Kan behöva upprepas om flaskan inte använts under längre tid.

Vid egen spädning av näsdroppar i endosbehållaren (alt. 2) administreras en halv pipett av färdigspädd lösning (0,1 mL).





Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL

(ex Nezeril) näsdroppar/nässpray

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Oximetazolin (registrerad produkt)

0,5 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

Oöppnade endosbehållare ska förvaras i sitt innerkuvert i rumstemperatur.

Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara 3 månader. Öppnad endosbehållare sparas inte.

0,5 mg/mL, Nässpray, lösning

Förvaras i rumstemperatur med skyddshuven påsatt. Vid användning för spädning: hållbar enligt utgångsdatum på förpackningen.

0,25 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

Får ej sparas, används direkt.

0,25 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

Oöppnade endosbehållare ska förvaras i sitt innerkuvert i rumstemperatur.

Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara 3 månader. Öppnad endosbehållare sparas inte.

0,25 mg/mL, Nässpray, lösning

Förvaras i rumstemperatur med skyddshuven påsatt. Använd en flaska per patient. Hållbarhet enligt utgångsdatum på förpackningen.