



## DOPamin intravenös inf 0,5 mg/mL

(Giludop)

### EN-STEGSSPÄDNING

Giludop		Glukos 50 alt 100 mg/mL		INF
20 mg/mL				
1 mL	+	39 mL	=	<b>0,5 mg/mL</b>
				40 mL

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Kontinuerlig infusion: Infusion i central ven eller stor perifer ven. Obs! får ej ges i artärfart. Extravasal infusion kan orsaka nekros.

### RIMLIG DOS för DOPamin intravenös inf 0,5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2,5 mikrog/kg/min	0,3 mL/tim	1,5 mL/tim	3 mL/tim	15 mL/tim
20 mikrog/kg/min	2,4 mL/tim	12 mL/tim	24 mL/tim	120 mL/tim

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Giludop (registrerad produkt)

20 mg/mL, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Ljusskyddade brytampull vid förvaring. Spara ej brytampull efter första uttag.

0,5 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur. Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Hypotension

Nyfödda: Startdos 3 - 5 mikrog/kg/min  
Vanlig dos 2,5 - 20 mikrog/kg/min

Barn 1 mån - 18 år: Startdos 5 mikrog/kg/min  
Vanlig dos 2,5 - 20 mikrog/kg/min

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

PubMed PMID Dempsey E, Rabe H, The Use of Cardiotonic Drugs in Neonates. Clin Perinatol, 2019, 46(2), 273-290

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31010560>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2019-06-04

ePedID: 4728

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-06-05

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-06-05

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**