



Ciprofloxacin lokalt 3 mg/mL

(Ciloxan) örondroppar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Örondroppar i flaska 3 mg/mL, med konserveringsmedel

ADMINISTRERINGSSÄTT

I yttre hörselgången:

TRYCK LÄTT i botten av flaskan, då kommer en droppe i taget. Kläm inte på flaskans sidor.

För att minska risken för obehag av kall lösning bör flaskan värmas i handen under flera minuter innan administrering.

Patienten bör ligga med det behandlade örat uppåt i minst 1 min efter appliceringen för att dropparna ska nå långt ner i hörselgången.

Undvik kontamination av dropparna genom att se till att droppspetsen inte vidrör örat, hörselgången eller någon annan yta.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ciprofloxacin (registrerad produkt)

3 mg/mL, Örondroppar, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Skyddas mot kyla. Får ej frysas. Öppnad förpackning är hållbar 4 veckor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Rinnande rötötit

Bör ordinerars i samråd med öronspecialist.

Ciprofloxacin kan vara indicerat då behandling med hydrokortison/oxitetracyklin/polymyxin B inte har gett önskad effekt och växt av ciprofloxacin känsliga bakterier har konstaterats.

Barn 1 - 18 år: 3 droppar/öra som ska behandlas x 2

Behandlingstid: 7 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Dropparna innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka irritation och hudreaktioner.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid otit
www.lakemedelsverket.se/otit

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-10-14

ePedID: 4733

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-10-14

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-10-14

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT