



Ciprofloxacin lokalt 2 mg/mL

(Cetraxal) örondroppar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Örondroppar i endosbehållare 2 mg/mL, utan konserveringsmedel

ADMINISTRERINGSSÄTT

I yttre hörselgången:

För att minska risken för obehag av kall lösning bör behållaren värmas i handen under flera minuter innan administrering.

Patienten bör ligga med det behandlade örat uppåt i minst 1 min efter appliceringen för att dropparna ska nå långt ner i hörselgången.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ciprofloxacin (registrerad produkt)

2 mg/mL, Örondroppar, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.

Endosbehållare i öppnad påse ska användas inom 8 dagar från öppnandet.

Öppnad endosbehållare ska användas direkt, sparas ej.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Rinnande rötöt

Bör ordinerars i samråd med öronspecialist.

Ciprofloxacin kan vara indicerat då behandling med hydrokortison/oxitetracyklin/polymyxin B inte har gett önskad effekt och växt av ciprofloxacin känsliga bakterier har konstaterats.

Barn 1 - 18 år: en endosbehållare/öra som ska behandlas x 2

Behandlingstid: 7 dagar

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid otit

www.lakemedelsverket.se/otit

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-10-14

ePedID: 4734

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-10-14

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-10-14

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT