



Amitriptylin

(ex Saroten) tabletter

Innan behandling med amitriptylin bör EKG tas för att utesluta förlängt QT-syndrom, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 10, 25 och 50 mg (ex Amitriptylin Abcur)
Tablett 8,8 mg, 22,1 mg och 44,2 mg (Amitriptyline Strides)

ADMINISTRERING

Oralt: Tabletterna intas med fördel på kvällen pga sederande effekt.

Tabletterna kan krossas och blandas med vatten för omedelbar administrering.

Enteralt: Oral lösning rekommenderas i första hand (finns som licenspreparat).
Tabletterna kan även krossas och blandas med vatten för omedelbar administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Amitriptylin (registrerad produkt)

Tablett

Burk: Förvaras i rumstemperatur. Blister: Fuktkänsligt, förvaras i originalförpackningen. Förvaras vid högst 30 °C. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Innan behandling med amitriptylin bör EKG tas för att utesluta förlängt QT-syndrom, se övrig information.

Neuropatisk smärta

För smärtlindring med amitriptylin ska patienten titreras individuellt till den lägsta effektiva dosen där adekvat smärtlindring erhålls med tolererbara läkemedelsbiverkningar.

Bör ordineras i samråd med smärtspecialist.

Barn 2 - 11 år: Initialt 200 - 500 mikrogram/kg x 1, max 10 mg/dos.
Dosen kan ökas vid behov till max 1 mg/kg x 2 av specialistläkare.

Barn 12 - 18 år: 10 mg x 1. Dosen kan ökas gradvis vid behov till 75 mg x 1.
Vid behov av högre doser än 75 mg bör det ordinerats av specialistläkare.

Utvärdera behandlingens effekt på smärta, funktionsnivå samt biverkningar och avsluta om önskad effekt inte uppnås.

Dosen ska trappas ned successivt vid utsättning av amitriptylin.





Amitriptylin

(ex Saroten) tabletter

ÖVRIG INFORMATION

Innan behandling med amitriptylin bör EKG tas för att utesluta förlängt QT-syndrom. Fall av QT-förlängning har rapporterats, därför ska det ges med försiktighet till patienter med bradykardi eller hos patienter som använder QT-förlängande läkemedel.

Sätt ut amitriptylin flera dagar innan kirurgi, om möjligt, då anestetika under behandling med amitriptylin kan öka risken för hypotension och arytmier.

Amitriptylin bör ges med stor försiktighet till patienter med hypertyreos eller patienter som får tyroideahormoner, då hjärtarytmier kan utvecklas.

Använd amitriptylin med försiktighet till patienter med epileptisk sjukdom då det kan sänka tröskeln för anfall. Försiktighet bör även iaktas vid behandling av patienter med svår lever- eller hjärt-kärlsjukdom, pylorusstenos och paralytisk ileus.

Amitriptylin kan orsaka antikolinerga biverkningar som yrsel, förvirring, urinretention samt muntorrhet.

Tas med fördel på kvällen pga sederande effekt.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna

<https://lv.se/depression-angest>

Micromedex

PubMed PMID Thour A, Marwaha R. Amitriptyline. 2022 May 15. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30725910>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade



Amitriptylin

(ex Saroten) tabletter



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4738

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-10-12

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT