



# Klindamycin oralt

(ex Dalacin) kapslar

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapslar 150 mg och 300 mg (ex Dalacin)

Klindamycin finns även som oral lösning 15 mg/mL, se annan instruktion.

## ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Långvarig eller upprepad kontakt kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner.

## ADMINISTRERING

Oralt:

Kapslarna bör sväljas hela tillsammans med vätska, patienten ska sitta upp. Bör inte öppnas/delas då klindamycin är lokalirriterande och det finns risk för skador på matstrupen.

Vid sväljsvårigheter kan dock kapseln öppnas och innehållet slamas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen, men risken för skador på matstrupen ska beaktas.

Enteralt:

Oral lösning rekommenderas i första hand, se annan instruktion. Kapseln kan dock öppnas och innehållet slamas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Klindamycin (registrerad produkt)

Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. Gäller båda styrkorna och alla fabrikat.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kapslarnas styrka och de olika doseringarna för olika indikationer gör att kapslarna är lämpliga för barn från ca 10 - 30 kg.

### Bakteriell infektion med bakterier känsliga för klindamycin

Barn 1 mån - 18 år

Normaldos: 5 - 8 mg/kg x 3, max 300 mg/DOS

Högdos:

(allvarlig infektion samt vid mindre känsliga bakterier enl resistensbestämning)

7,5 - 10 mg/kg x 4, max 600 mg/DOS

Alternativt fast dosering enl. produktresumé:

Barn 30 - 45 kg: 150 mg x 3

Barn över 45 kg: 300 mg x 2 alt. 150 mg x 3 - 4. Dosen kan ökas till 300 mg x 3 - 4.

### Akut streptokocktonsillit, vid recidiv inom 4 veckor samt vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 300 mg/DOS

Behandlingstid: 10 dagar

### Endokarditprofilax, alternativ vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år:

Engångsdos 30 - 60 min före ingrepp: (15 -) 20 mg/kg, max 600 mg

### Impetigo, sårinfektioner, erysipelas, stjärtfluss, preseptal cellulit; alternativ vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 300 mg/DOS

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

### Uppföljande peroral behandling vid skelettinfectioner så som osteomyelit, septisk artrit och spondylodiskit, dock ej vid infektion orsakad av Kingella kingae eller Haemophilus influenzae. Alternativ vid penicillinallergi.

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 3, max 300 mg/DOS

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: minst 4 veckor





## Klindamycin oralt

(ex Dalacin) kapslar

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<https://klokalistan.se/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Internetadress VGR, Alfresco - Endokarditprofylax på barn

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su9805-1593997-2518/surrogate/Endokarditprofylax%20p%c3%a5%20barn.pdf>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Antibiotikaprofylax i tandvården

[www.lakemedelsverket.se/profylax-tandvard](http://www.lakemedelsverket.se/profylax-tandvard)

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid faryngotonsillit

[www.lakemedelsverket.se/faryngotonsillit](http://www.lakemedelsverket.se/faryngotonsillit)

NeoFax

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturöversikt 2010

<http://www.sbu.se/contentassets/bfd8f676b4ed409898523fabecfab19/antibiotikaprofylax.pdf>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk barninfektionsförening - Led- och skelettinfectioner hos barn

<https://inf.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4747](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4747)



# Klindamycin oralt

(ex Dalacin) kapslar



## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4747

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2025-03-11

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**