



# Serum mot huggormsgift intravenös inf

(Viperfav licens) hästserum

Behandlingen sker i samråd med Giftinformationscentralen, tel 010- 456 67 19.

## Tillsatser som ger Serum mot huggormsgift intravenös inf

Viperfav	1 ampull
NaCl 9 mg/mL	100 mL

### Beredningsinstruktion:

Innehållet från 1 st ampull (4 mL) Viperfav tillsätts till 100 mL NaCl 9 mg/mL.

Hela volymen ska ges till patienten oavsett ålder och vikt.

## ADMINISTRERING

Intravenös infusion: 60 minuter

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Viperfav (licensprodukt)

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Förvaras i kylskåp. Får inte frysas. Direkt efter iordningställande ska hela volymen ges till patienten.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandlingen sker i samråd med Giftinformationscentralen, tel 010 - 456 67 19.

För övervakning, se Giftinformation.se, (klickbar i referenser).  
Om serum ges krävs observation minst 24 timar efter given dos.

### Huggormsbett

Behandling ska ges så tidigt som möjligt vid:

- Alla typer av allmänpåverkan som inte snabbt går i regress eller återkommer. OCH/ELLER
- Vid snabb progress av lokalreaktionen.

Barn 1 mån - 18 år och vuxna: 1 ampull x 1 (4 mL)

Dosen ska tillsättas till NaCl innan administrering.

Ca 15 - 30 minuter efter att full dos serum administrerats görs en noggrann undersökning av bettstället och lokalskadans utbredning markeras med tusch.

Markeringen används som utgångspunkt för upprepade bedömningar som bör schemaläggas 2 timmar efter serumtillförsel och därefter var 6:e timme tills minst 24 timmar har förflutit sedan serum gavs. Bedömningar utförs tätare om patienten uppvisar ökande symtom.

Vid recidiv sker en tydlig progress av lokalreaktionens utbredning och upprepad dos av serum kan vara aktuellt.

## ÖVRIG INFORMATION

Viperfav har en större molekylstorlek, jämfört med ViperATAB (tidigare använt serum mot huggormsgift). Den större molekylstorleken medför en längre halveringstid och därmed minskar risken för återkommande giftverkan och behov av upprepad serumtillförsel (jämfört med vad som setts för ViperATAB).

Akuta allergiska reaktioner är mycket ovanliga för detta preparat.





## Serum mot huggormsgift intravenös inf

(Viperfav licens) hästserum

### REFERENS/LÄNK

Giftinformationscentralen Antidotregistret

<https://giftinformation.se/Antidot>

Giftinformationscentralen Huggormsbett

<https://giftinformation.se/lakare/substanser/huggorm/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Summary of Product Characteristics (SPC) VIPERFAV

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4752](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4752)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 4752

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2026-03-31

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**