



Desmopressin oralt

(ex Minirin) tabletter

Vätskerestriktion ska iakttas på kvällen, se Övrig information.

Kontraindicerat vid habituell eller psykogen polydipsi (dygnsurin över 40 mL/kg)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Frystorkade tabletter 25, 50, 60, 120 och 240 mikrog (Minirin, Nocdurna)
Tabletter 0,1 och 0,2 mg (= 100 och 200 mikrog) (Nocutil, Desmopressin Ferring)

Doseringen skiljer sig mellan de olika beredningsformerna, se Övrig information.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Frystorkade tabletter är spröda och ska tas ur blisterkartorna genom att dra av aluminiumhöljet. De ska inte tryckas genom folien.

Oralt: Frystorkade tabletter placeras under tungan där de löses upp utan vatten.

Tabletterna (ej frystorkade) kan delas i två delar för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge en mindre dos. Sväljs med en mindre mängd vätska.

Enteralt i sond: Tabletterna (ej frystorkade) kan krossas och slammas upp i 10 mL vatten och därefter administreras i nasogastrisk sond (från French 8). Upplösning kan ta upp till 5 min.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Desmopressin (ex Minirin) (registrerad produkt)

25 mikrog, Frystorkad tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Fuktkänsligt. Gäller även styrkorna 50, 60, 120 och 240 mikrogram.

0,1 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Gäller även styrkan 0,2 mg. Desmopressin Ferring är enligt företaget fuktkänslig.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Doseringen skiljer sig mellan de olika beredningsformerna.

Primär nattlig enures

Barn 6 - 18 år

Startdos 120 mikrog x 1, till natten (frystorkad tablett)
alternativt

Startdos 200 mikrog x 1, till natten (tablett)

Dosen kan dubbleras om utebliven effekt, max 240 mikrog (frystorkad tablett) och max 400 mikrog (= 0,4 mg) (tablett)

Bedömning om behov av fortsatt behandling bör göras var 3:e månad genom minst en veckas behandlingsuppehåll.

Central diabetes insipidus

Barn 3 - 18 år

Startdos 60 mikrog x 3 (frystorkad tablett)
alternativt

Startdos 100 mikrog x 3 (tablett)

Vanlig underhållsdos 60 - 120 mikrog x 3 (frystorkad tablett) och 100 - 200 mikrog x 3 (= 0,1 - 0,2 mg) (tablett)

Nocturi

Läkemedelsbehandling rekommenderas vanligen INTE.

Startdos 60 mikrog x 1, till natten (frystorkad tablett)
alternativt

Startdos: 100 mikrog x 1, till natten (tablett)

Max 240 mikrog (frystorkad tablett) och max 400 mikrog (= 0,4 mg) (tablett)

Tillgängliga kliniska data är begränsade till en behandlingstid på 12 månader. Behovet av fortsatt behandling skall dock kontrolleras regelbundet.



Desmopressin oralt (ex Minirin) tabletter



ÖVRIG INFORMATION

Vid behandling av nattlig enures bör vätskeintaget begränsas till ett minimum under perioden från 1 - 2 timmar före till 8 timmar efter administrering (nästa morgon).

Om tecken på vattenretention/hyponatremi vid behandling av central diabetes insipidus, bör behandlingen tillfälligt avbrytas och dosen justeras. Om dessa tecken uppkommer vid behandling av primär nattlig enures bör behandlingen tillfälligt avbrytas tills patienten återhämtat sig helt.

Doseringen skiljer sig mellan de olika beredningsformerna.
Frystorkad tablett doseras utifrån desmopressin, styrkan 60 mikrog motsvarar 67 mikrog desmopressinacetat (salt-formen).
Tablett doseras utifrån saltformen desmopressinacetat, 100 mikrog motsvarar 89 mikrog desmopressin.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Internetmedicin, Enures, sängvätning

<https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=436>

Pediatric Dosage Handbook

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Enuresvårdprogram 2019

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/8/2019/08/Enuresv%C3%A5rdprogram-slutversion.pdf>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-02-05

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-02-05

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4785

Versionsnummer, major: 1

Giltig fr o m: 2020-02-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT