



Desmopressin oralt

(ex Minirin) tablett

Kontraindicerat vid habituell eller psykogen polydipsi (dygnsurin över 40 mL/kg)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Frystorkade tablett och resoriblett 60, 120 och 240 mikrog (ex Minirin)
Tablett 0,1 och 0,2 mg (= 100 och 200 mikrog) (Nocutil, Desmopressin Ferring)

Doseringen skiljer sig mellan de olika beredningsformerna, se Övrig information.

ADMINISTRERING

Läkemedlet ska alltid tas på samma sätt i förhållande till födointag eftersom föda minskar absorptionen.

Frystorkade tablett är spröda och ska tas ur blisterkartorna genom att dra av aluminiumhöljet. De ska inte tryckas genom folien.

Tabletterna (ej frystorkade eller resoriblett) kan delas i två delar för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge en mindre dos.

Oralt:

Frystorkade tablett och resoriblett placeras under tungan där de löses upp utan vatten. Vanliga tablett sväljs med en mindre mängd vätska.

Enteralt:

Tabletterna (ej frystorkade) kan krossas och lösas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen. Upplösningen kan ta upp till 5 min.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Desmopressin (registrerad produkt)

Frystorkad tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.
Gäller alla styrkor.

Tablett

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Gäller båda styrkorna.
Desmopressin Ferring är enligt företaget fuktkänsligt.

Resoriblett, sublingual

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Doseringen skiljer sig mellan de olika beredningsformerna, se Övrig information.

Primär nattlig enures

Vätskeintaget bör begränsas till ett minimum under perioden från 1 - 2 timmar före till 8 timmar efter administrering (nästa morgon).

Barn 6 - 18 år:

Startdos frystorkad tablett/resoriblett: 240 mikrog x 1, till natten
alternativt

Startdos tablett: 400 mikrog x 1 (= 0,4 mg x 1), till natten

Underhållsdos: om behandlingen fungerar, vilket märks inom max 2 veckor, kan försök att halvera dosen göras.

Dosen ska tas 30 - 60 min innan sänggåendet, inte senare.

Bedömning om behov av fortsatt behandling bör göras var 3:e månad genom minst en veckas behandlingsuppehåll.

Central diabetes insipidus

Barn 3 - 18 år:

Startdos frystorkad tablett/resoriblett: 60 mikrog x 3
alternativt

Startdos tablett: 100 mikrog (= 0,1 mg) x 3

Vanlig underhållsdos:

Frystorkad tablett/resoriblett: 60 - 120 mikrog x 3

Tablett: 100 - 200 mikrog x 3 (= 0,1 - 0,2 mg)





Desmopressin oralt

(ex Minirin) tabletter

ÖVRIG INFORMATION

Om tecken på vattenretention/hyponatremi vid behandling av central diabetes insipidus, bör behandlingen tillfälligt avbrytas och dosen justeras. Om dessa tecken uppkommer vid behandling av primär nattlig enures bör behandlingen tillfälligt avbrytas tills patienten återhämtat sig helt.

Doseringen skiljer sig mellan de olika beredningsformerna.
Frystorkad tablett och resoriblett doseras utifrån desmopressin, styrkan 60 mikrog motsvarar 67 mikrog desmopressinacetat (salt-formen).
Tablett doseras utifrån saltformen desmopressinacetat, 100 mikrog motsvarar 89 mikrog desmopressin.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Internetmedicin - Enures, sängvätning

<https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=436>

Rekommendation , (Grade 2A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Enuresvårdprogram 2019

<https://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4785

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-07-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT