



Sertralin oralt 20 mg/mL

(Zoloft) koncentrat till oral lösning

SKA spädas före användning.

Risk för nyttillkommen suicidalitet när antidepressiva läkemedel ges till barn.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Koncentrat till oral lösning 20 mg/mL - SKA spädas vidare.

Beredningsinstruktion:

Ordinerad dos av koncentrat sertralin 20 mg/mL tillsätts till ca 120 mL vatten, läsk eller apelsinjuice och dricks omgående.

Lösningen kan ibland bli något grumlig efter blandningen, vilket är helt normalt.

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Sertralin (ex Zoloft) (registrerad produkt)

20 mg/mL, Koncentrat till oral lösning

Förvaras vid högst 30 °C. Efter öppnande: hållbar 28 dagar. Färdigberedd lösning ska administreras omgående efter spädning och får inte sparas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska skötas av specialist inom barn- och ungdomspsykiatri.

Ångest och tvångssyndrom

Strukturerad psykopedagogisk behandling rekommenderas i första hand.

Startdos

Barn 6 - 12 år: 12,5 - 25 mg x 1 (0,625 - 1,25 mL)

Barn 13 - 18 år: 25 - 50 mg x 1 (1,25 - 2,5 mL)

Upptitrering

Barn 6 - 12 år: Öka dosen veckovis med 12,5 - 25 mg/dygn

Barn 13 - 18 år: Öka dosen veckovis med 25 - 50 mg/dygn

Måldos

Ångestsyndrom 50 - 150 mg x 1, max 200 mg

Tvångssyndrom 75 - 200 mg x 1, max 200 mg

Utsättning

Planeras efter remission och vid ett stabilt livsskede, april och maj kan vara lämpliga månader.

Trappa gradvis ut dosen under 8 - 10 veckor.



Sertralin oralt 20 mg/mL (Zoloft) koncentrat till oral lösning



VANLIG INDIKATION OCH DOS

Depression, medelsvår till svår

Strukturerad psykopedagogisk behandling rekommenderas i första hand.

Startdos

Barn 6 - 12 år: 12,5 - 25 mg x 1 (0,625 - 1,25 mL)

Barn 13 - 18 år: 25 - 50 mg x 1 (1,25 - 2,5 mL)

Upptitrering

Barn 6 - 12 år: Öka dosen veckovis med 12,5 - 25 mg/dygn

Barn 13 - 18 år: Öka dosen veckovis med 25 - 50 mg/dygn

Måldos

Barn 6 - 18 år: 50 - 100 mg x 1, max 200 mg

Utsättning

Planeras efter remission och vid ett stabilt livsskede, april och maj kan vara lämpliga månader.

Trappa gradvis ut dosen under 8 - 10 veckor.

ÖVRIG INFORMATION

Försiktighet vid behandling av patienter med andra riskfaktorer för förlängning av QT-intervallet eller för andra hjärtsjukdomar.

Hypokalemi och hypomagnesemi ökar risken för maligna arytmier.

Sertralin, andra SSRI-preparat och serotonin-noradrenalin-återupptagshämmare (SNRI) ger en ökad risk för blödning, inklusive gastrointestinala blödningar.

Vanliga biverkningar är exempelvis insomni, ångest, minskad sexlust, minskad aptit, illamående, diarré, muntorrhet.

Lösningen innehåller 145 mg etanol/mL, vilket motsvarar mindre än 5 mL öl eller 2 mL vin.





Sertralin oralt 20 mg/mL (Zoloft) koncentrat till oral lösning

REFERENS/LÄNK

Bok Lundgren C., FAS UT 3

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje Depression, 2014

<http://www.sfbup.se/vardprogram/depression/>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje ångest- och tvångssyndrom, 2018

<http://www.sfbup.se/vardprogram/sfbups-riktlinjer-for-angest-och-tvangssyndrom/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna

<https://lv.se/depression-angest>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi

ePedID: 4792

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-08-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT