



Sertralin oralt

(ex Zoloft) tabletter

Risk för nyttillkommen suicidalitet när antidepressiva läkemedel ges till barn.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 25, 50 och 100 mg (ex Zoloft).

Sertralin finns även som koncentrat till oral lösning, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Besvär med illamående kan för vissa minskas om sertralin tas i samband med måltid. Risken för sömnbesvär kan eventuellt minskas av att dosen administreras på morgonen.

Oralt: Tablett 25 mg saknar brytskåra och bör därför inte delas.

De flesta tabletter på 50 och 100 mg har en brytskåra som möjliggör att tablett kan delas i två lika stora delar/doser. Dock kan det skilja sig mellan olika tillverkare, se produktresumé.

Enteralt: Använd i första hand oral lösning, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Sertralin (ex Zoloft) (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatri.

För doser under 25 mg, överväg oral lösning, se annan instruktion.

Ångestsyndrom (1:a handsval)

Startdos

Barn 6 - 12 år: 12,5 mg x 1

Barn 13 - 18 år: 25 mg x 1

Upptitrering

Barn 6 - 18 år: Öka dosen efter 1 - 2 veckor med 12,5 - 25 mg/dygn.

Initial måldos 50 - 100 mg x 1, utvärderas efter 3 - 4 veckor.

Upptitreras till effekt eller biverkning uppkommer. Maxdos 200 mg/dygn

Tvångssyndrom (1:a handsval)

Startdos

Barn 6 - 12 år: 12,5 mg x 1

Barn 13 - 18 år: 12,5 - 25 mg x 1

Upptitrering

Barn 6 - 12 år: Öka dosen var 3:e till 7:e dag med 12,5 - 25 mg/dygn

Barn 13 - 18 år: Öka dosen var 3:e till 7:e dag med 25 mg/dygn

Initial måldos

Barn 6 - 12 år: 75 mg x 1

Barn 13 - 18 år: 100 mg x 1

Upptitreras till effekt eller biverkning uppkommer. Maxdos 200 mg/dygn





Sertralin oralt

(ex Zoloft) tabletter

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Depression, medelsvår till svår (2:a handsval)

Startdos

Barn 6 - 12 år: 12,5 - 25 mg x 1

Barn 13 - 18 år: 25 - 50 mg x 1

Upptitrering

Barn 6 - 12 år: Öka dosen veckovis med 12,5 - 25 mg/dygn

Barn 13 - 18 år: Öka dosen veckovis med 25 - 50 mg/dygn

Måldos

Initial måldos 50 - 100 mg x 1, utvärderas efter 3 - 4 veckor.

Upptitreras till effekt eller biverkning uppkommer. Maxdos 200 mg/dygn

ÖVRIG INFORMATION

Icke farmakologisk behandling (ex strukturerad psykopedagogisk behandling) rekommenderas innan läkemedelsbehandling är aktuell.

Sertralin, andra SSRI-preparat och serotonin-noradrenalin-återupptagshämmare (SNRI) ger en ökad risk för blödning, inklusive gastrointestinala blödningar.

Biverkningar av SSRI såsom hyperaktivitet, impulsivitet, rastlöshet, aggressivitet, störd sömn och självsador benämns ofta som aktivering. Biverkningarna är dosberoende, kommer tidigt vid dosökning och avklingar direkt vid dosreduktion eller utsättning. Det är den vanligaste orsaken till avbrott av behandlingen.

Risken är större vid lägre ålder, vid samtidiga adhd-symtom och vid snabbare dositering samt högre doser av SSRI.

Utsättning planeras beroende av indikationen 6 - 12 månader efter remission i ett stabilt livsskede. Det kan vara en fördel att trappa ut på våren eller sommaren när det är ljusare ute. Dosen trappas ut gradvis under 3 månader.



Sertralin oralt (ex Zoloft) tabletter



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Farmakainstruktion - Kunskapsstöd för barn- och ungdomspsykiatrisk läkemedelsbehandling inom BUP Stockholm

<https://www.bup.se/om-oss/samarbeten-och-samverkan/for-dig-som-ar-vardgivare/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer: Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna (2025)

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer?q=depression>=0>

Micromedex

PubMed PMID Hetrick SE et al. New generation antidepressants for depression in children and adolescents: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2021

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34029378>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri Riktlinje ångest- och tvångssyndrom, 2024

<https://slf.se/sfbup/riktlinjer/>

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri SFBUP - Riktlinje Depression, 2024

<https://slf.se/sfbup/riktlinjer/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 4798

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-02-25

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT