



# Atrakurium intravenös inf/inj 1 mg/mL

(ex Atracurium-hameln) nyfödda

Ordineras av anestesilog/neonatolog.

Noggrann övervakning och respiratorunderstöd krävs.

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Denna instruktion lämpar sig för nyfödda. För äldre barn, se annan instruktion.

## EN-STEGSSPÄDNING

Atrakurium 10 mg/mL 1 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 9 mL	=	INJ-INF LÖ <b>1 mg/mL</b> 10 mL
--------------------------------	---	---	---	---------------------------------------

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion/infusion

Intravenös infusion (kontinuerlig)

Får ej ges i samma system som blodtransfusion då atrakurium är hypotont och kan orsaka hemolys.

## ÖVRIG INFORMATION

Försiktighet vid administrering till patienter med allvarliga rubbningar i elektrolyt- och/eller syra-basbalansen.

Atrakurium kan, precis som andra neuromuskulärt blockerande medel, orsaka frisättning av histamin hos känsliga patienter. Långsam administrering kan minska frisättningen av histamin.

Risk för bronkospasm, särskilt vid administrering till patienter med allergi eller astma.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Muskelrelaxation vid intubation och/eller kirurgiska ingrepp - Intensivvård

För lämpligt handhavande vid intubering, se lokal riktlinje.

Laddningsdos, injektion

Nyfödda (begränsad evidens): 0,3 mg/kg

Barn 1 mån - 18 år: 0,3 - 0,6 mg/kg

Ger adekvat relaxation under 15 - 35 min.

Vid behov kan ytterligare 0,1 - 0,2 mg/kg ges.

Kontinuerlig infusion

Nyfödda (begränsad evidens): 0,3 - 0,4 mg/kg/tim

Barn 1 mån - 18 år: 0,3 - 0,6 mg/kg/tim

Vid hypotermi bör dosen halveras.

För obesa patienter bör atrakurium doseras utifrån ideal kroppsvikt.

## RIMLIG DOS FÖR 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,3 mg/kg	0,3 mL	1,5 mL	-	-
0,4 mg/kg/tim	0,4 mL/tim	2 mL/tim	-	-

## REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress VGR, Alfresco - Atracuriumbesylat (Atracurium) - neonatalvård

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/24379?/a=false&guest=true>

Pediatric Injectable Drugs

Rekommendation ,(Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)





## Atrakurium intravenös inf/inj 1 mg/mL

(ex Atracurium-hameln) nyfödda

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Atrakurium (från registrerad produkt)

10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förpackning ska förvaras i kylskåp (2 - 8 °C). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Bruten ampull får ej sparas, används direkt.

1 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 12 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kylskåp. Spädning i glukos 50 mg/mL: 8 timmar i rumstemperatur.

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4815](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4815)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-12-17

ePedID: 4815

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-12-18

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-12-18

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**