



Lidokain utvärtes 40 mg/g

(LidoGalen licens) kräm

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Lidokain kräm 40 mg/g (LidoGalen licens)

LidoGalen motsvarar Maxilene 40 mg/g (tillhandahålls f.n inte)

ADMINISTRERING

Utvärtes: Krämen ska appliceras tjockt på huden och lämnas orörd. Behöver inte täckas med förband för effektens skull, men kan rekommenderas för att förhindra kladd. Strax innan procedur ska krämen torkas bort.

Effekten inträder tidigast efter 30 minuter.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

LidoGalen (licensprodukt)

40 mg/g, Kräm

Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter öppnad förpackning, annars 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

1 gram kräm motsvarar ca 3,5 cm kräm ur en 30 g-tub.

Lokalanestetikum inför venkanylering eller venpunktion

Barn 1 - 2 mån: högst 1 gram kräm, max 1 tim applikationstid

Barn 3 - 11 mån: högst 1 gram kräm, max 4 tim applikationstid

Barn 1 - 18 år: 1 - 2,5 gram kräm, max 5 tim applikationstid

ÖVRIG INFORMATION

Krämen innehåller hydrerad sojabönslecitin och ska därför inte användas till patienter som är allergiska mot jordnötter och/eller soja.

LidoGalen innehåller endast lidokain och inte prilokain, därmed minskar risken för methemoglobinemi och kärlkonstriktion.

LidoGalen ska inte användas till nyfödda yngre än 1 månad på grund av dess innehåll av propylenglykol. 1 g kräm innehåller 75 mg propylenglykol. Den europeiska läkemedelsmyndigheten anger följande gränsvärden (maximal daglig dos som hjälpämne i läkemedel) för propylenglykol:

Nyfödda 1 mg/kg/dygn

Barn 1 mån - 4 år 50 mg/kg/dygn

Barn 5 - 18 år 500 mg/kg



Lidokain utvärtes 40 mg/g (LidoGalen licens) kräm



REFERENS/LÄNK

European Medicines Agency (EMA) Questions and answers on propylene glycol used as an excipient in medicinal products for human use

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/questions-answers-propylene-glycol-used-excipient-medicinal-products-human-use_en.pdf

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Galenpharma lidogalen creme

<https://galenpharma.de/en/product/lidogalen-creme/>

PubMed PMID Bond et al. First do no harm: pain relief for the peripheral venous cannulation of adults, a systematic review and network meta-analysis

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27716082>

PubMed PMID Koh et al 2004. A randomized, double-blind comparison study of EMLA and ELA-Max for topical anesthesia in children undergoing intravenous insertion.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15601345>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4839

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-02-07

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT