



Deferasirox oralt

(ex Exjade) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Filmdragerade tabletter 90, 180 och 360 mg

ADMINISTRERING

Oralt: Tabletterna kan tas på fastande mage eller tillsammans med en lätt måltid. Kan krossas och strös över t ex yoghurt, i direkt anslutning till administrering.

Enteralt: Tabletterna kan krossas och slammas upp i vatten, i direkt anslutning till administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Deferasirox (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor och fabrikat.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska ordinerar i samråd med hematolog.

Järnöverskott vid icke-transfusionsberoende talassemisyndrom

Barn 10 - 18 år: 7 mg/kg x 1

Järnöverskott till följd av blodtransfusioner t. ex. vid talassemia major

Barn 2 - 18 år:

Dosen justeras utifrån ferritinnivåer och mängd blodtransfusion

	Rekommenderad	Hög*	Låg ^a
Startdos	14 mg/kg	21 mg/kg	7 mg/kg

* Högre startdos kan krävas för patienter som kräver reduktion av mycket höga järnnivåer eller som får höga doser erytrocytkoncentrat (mer än 14 mL/kg/månad).

^a Lägre startdos kan övervägas för patienter som inte har så höga järnnivåer eller som får låga doser erytrocytkoncentrat (inte mer än 7 mL/kg/månad).

Maxdos: 28 mg/kg

Det rekommenderas att S-Ferritin följs upp varje månad för att utvärdera behandlingssvaret och för att minimera risken för överkelatering. Dosjusteringar utförs vid behov baserat på serumferritinnivå var 3:e eller 6:e månad.





Deferasirox oralt

(ex Exjade) tabletter

ÖVRIG INFORMATION

För barn i åldern mellan 2 och 5 år är exponeringen lägre än för vuxna. Denna åldersgrupp kan därför behöva högre doser än vad som krävs för vuxna, men den initiala dosen ska vara samma som för vuxna, med efterföljande individuell titrering.

För att minimera risken för njurskada bör njurfunktionen skattas genom GFR-mätning innan behandlingsstart, varje vecka under den första månaden av behandlingen och vid ändrad behandlingsdos.

För att minimera risken för leverskada bör leverfunktionen följas upp genom att kontrollera serumtransaminaser, bilirubin och alkaliskt fosfat innan behandlingsstart, varannan vecka under första månaden av behandlingen och därefter varje månad.

Hörsel- och synpåverkan har rapporterats, och därför rekommenderas hörsel- och synundersökning före behandlingsstart samt därefter var 12:e månad under hela behandlingsperioden.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok Don't Rush to Crush. The Society of Hospital Pharmacists of Australia. Fourth edition, 2021.

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Medicines for children Leaflet information Deferasirox for removing excess iron

<https://www.medicinesforchildren.org.uk/deferasirox-removing-excess-iron-0>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Pediatrisk hematologi och onkologi - Talassemi och kronisk blodtransfusion

<https://pho.barnlakarforeningen.se/vardplaneringsgrupper/vph-varplaneringsgruppen-for-pediatrisk-hematologi/wardprogram-vph/>



Deferasirox oralt

(ex Exjade) tabletter



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4846

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-09-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT