



Aripiprazol oralt 1 mg/mL

(ex Abilify) oral lösning

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond: Kan ges via i nasogastrisksond, från 8 French.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Aripiprazol (ex Abilify) (registrerad produkt)

1 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Hållbarhet efter första öppnandet: 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri/barnneurologi. Viktigt med individuell dositering och kontinuerlig utvärdering av effekt och biverkningar. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas.

Akut manisk episod, bipolär sjukdom, psykos

Startdos

Barn 13 - 18 år: 2 mg x 1, i 2 dagar (2 mL)

Upptitrering

Därefter 5 mg x 1, i 2 dagar. Fortsätt upptrappning till måldos 10 - 15 mg x 1. Doser över 10 mg ska endast användas i undantagsfall, max 30 mg.

Utsättning

Max 12 veckors behandling. Dosen ska trappas ned gradvis under stabila förhållanden, för att minska risken för utsättningsymtom eller återfall.

Tvångssyndrom medelsvår till svår, tilläggsbehandling

Startdos

Barn 13 - 18 år: 0,5 - 1 mg x 1 (0,5 - 1 mL)

Upptitrering

Därefter rekommenderas långsam upptitrering varannan vecka, till måldos 2,5 - 5 mg x 1

Utsättning

Dosen ska trappas ned gradvis under stabila förhållanden, för att minska risken för utsättningsymtom eller återfall.



Aripiprazol oralt 1 mg/mL

(ex Abilify) oral lösning



VANLIG INDIKATION OCH DOS

Beteendestörningar/aggressivt utåtagerande
Svåra beteenden vid autismspektrumtillstånd eller vid intellektuell funktionsnedsättning

Tics och Tourettes syndrom (begränsad evidens)

Startdos

Barn 13 - 18 år: 1 - 2 mg x 1 (1 - 2 mL)

Upptitrering

Därefter rekommenderas långsam upptitrering varannan vecka.

Maxdos 0,2 mg/kg/DYGN eller 10 mg/DYGN.

Utsättning

Korttidsbehandling rekommenderas.

Dosen ska trappas ned gradvis under stabila förhållanden, för att minska risken för utsättningssymtom eller återfall.

ÖVRIG INFORMATION

Viktigt med långsam upptitrering för att minska risken för akatisi.

Vanliga biverkningar är ex tremor, huvudvärk och extrapyramidala störningar.

Interagerar med andra läkemedel som påverkar CYP2D6 (ex. fluoxetin) vilket kan resultera i ändrad koncentration av aripiprazol.



Aripiprazol oralt 1 mg/mL (ex Abilify) oral lösning



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Internetmedicin - Bipolär sjukdom hos barn

<https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=7814>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Bipolär sjukdom, 2014

<http://www.sfbup.se/vardprogram/spfs-riktlinjer-for-bipolar-sjukdom/>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje ångest- och tvångssyndrom, 2018

<http://www.sfbup.se/vardprogram/sfbups-riktlinjer-for-angest-och-tvangssyndrom/>

Internetadress Svenska psykiatriska föreningen - Bipolär sjukdom

<http://www.sfbup.se/wp-content/uploads/2017/01/FARDIG-Bipolara-riktlinjer.pdf>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neuroleptika vid vissa psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar

<https://lv.se/neuroleptikatillbarn>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Ichikawa H. et al. Aripiprazole in the Treatment of Irritability in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder in Japan: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28004215>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-03-01

ePedID: 4852

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-05-08

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-05-08

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT