



Atomoxetin oralt 4 mg/mL

(ex Strattera) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Oral lösning 4 mg/mL (Strattera, Atomoxetine licens)

INGEN SPÄDNING

ORAL LÖSN
4 mg/mL
100 mL

ARBETSMILJÖ

Undvik direktkontakt med produkten. Substansen är irriterande för ögonen, följ lokal rutin.

ADMINISTRERING

Atomoxetin tas vanligen som en singeldos på morgonen. Vissa patienter kan dock ha nytta av att dela upp dosen i en morgondos och en dos sent på eftermiddagen alt. tidigt på kvällen.

Oralt: Den orala lösningen har en bitter smak och kan blandas med en liten mängd mjuk mat/vätska som maskerar smaken, exempelvis koncentrerad saft.

Enteralt

.....
RIMLIG DOS för atomoxetin oral suspension 4 mg/mL

	20 kg	30 kg	50 kg	70 kg
0,5 mg/kg	2,5 mL	3,75 mL	6,25 mL	
1,2 mg/kg	6 mL	9 mL	15 mL	
1,8 mg/kg, max 80 mg	9 mL	13,5 mL	20 mL	
40 mg			10 mL	10 mL
100 mg				25 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling bör inledas och övervakas av läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri eller barnmedicin.

Kontrollera puls och blodtryck inför insättning av atomoxetin och därefter regelbundet efter varje dosökning och minst var sjätte månad, se Barnläkarföreningens Vårdprogram för barnkardiologisk övervakning (klickbar i referenser).

Atomoxetin metaboliseras av CYP2D6 och interagerar starkt med flera läkemedel, se Övrig information.

ADHD, monoterapi eller tilläggsbehandling

Barn 6 - 18 år:

UNDER 70 kg:

Startdos: 0,5 mg/kg x 1, ges i 1 - 2 veckor

Trappa därefter upp till lägsta effektiva dos vanligen 1,2 mg/kg x 1.

Observera att för doser över 1,2 mg/kg är evidensen låg men i vissa fall kan doser upp till 1,8 mg/kg/DYGN ges.

Maxdos: 1,8 mg/kg/DYGN, dock max 80 mg/DYGN

FRÅN 70 kg:

Startdos: 40 mg x 1, ges i 1 - 2 veckor

Trappa därefter upp till lägsta effektiva dos vanligen 60 - 100 mg x 1

Maxdos: 100 mg/DYGN

Uppföljning av klinisk effekt och biverkningar bör ske tätare under de första sex månaderna. Därefter minst var sjätte månad. Den långsiktiga nyttan ska regelbundet omvärderas.





Atomoxetin oralt 4 mg/mL

(ex Strattera) oral lösning

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Atomoxetin (registrerad produkt)

4 mg/mL, Oral lösning

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska är hållbar i 45 dagar.

Atomoxetin. (licensprodukt)

4 mg/mL, Oral lösning

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska är hållbar i 45 dagar.

ÖVRIG INFORMATION

Hos patienter med missbruk/risk för missbruk kan atomoxetin vara förstahandsval vid behandling av ADHD.

Vikt och längd ska följas under behandling då atomoxetin har förknippats med långsammare viktökning och minskad slutlängd.

Interaktioner att beakta

- Atomoxetin interagerar starkt med MAO-hämmare, ett 2 veckors medicinfritt intervall krävs mellan behandlingarna.
- Vid samtidig behandling med fluoxetin bör dosen av atomoxetin halveras då båda läkemedlen metaboliseras av CYP2D6. Kombinationen kan leda till flerfaldig ökning av plasmakoncentrationen av atomoxetin.
- Dosen för atomoxetin bör titreras upp långsamt med en lägre måldos vid samtidig behandling med andra läkemedel som är starka hämmare av CYP2D6.



Atomoxetin oralt 4 mg/mL

(ex Strattera) oral lösning



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 4854

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-12-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT