



Dexamfetamin oralt

(ex Attentin) tablett

Kortverkande centralstimulantia. Högre missbruksrisk jämfört med ex lisdexamfetamin.

Narkotikaklassat. Stödbegärligt.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 5, 10 och 20 mg

ADMINISTRERING

Doseras vanligen på morgonen. Dexamfetamin bör inte tas för lång tid efter lunch för att undvika sömnsvårigheter.

Krysskåran är inte avsedd för att kunna ge delmängd, gäller för samtliga tablettstyrkor.

Oralt:

För att underlätta nedsväljning kan tableterna delas.

Enteralt:

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Dexamfetamin (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i originalförpackningen vid högst 30°C. Fuktkänsligt. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska inledas och övervakas av läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri bl.a., se Övrig information.

Använd endast i undantagsfall pga risk för felanvändning/missbruk.

Dexamfetamin kan vara ett alternativ om lisdexamfetamin ger besvärande biverkningar eller om en extra dos tillfälligt behövs.

Kontrollera puls och blodtryck inför insättning av dexamfetamin och därefter regelbundet efter varje dosökning och minst var sjätte månad, se Barnläkarförningens Vårdprogram för barnkardiologisk övervakning (klickbar i referenser).

Behandlingstiden bör vara så kort som möjligt. Uppföljning av klinisk effekt bör ske tätare under de första sex månaderna. Därefter minst var sjätte månad. Den långsiktiga nyttan ska regelbundet omvärderas.

Rekommenderas att inte skriva ut för mer än 3 månaders förbrukning per receptförskrivning. Detta för att minska risken att läkemedlet hamnar i orätta händer.

ADHD, monoterapi (ej förstahandsval)

Barn 6 - 18 år: Startdos 5 mg x 1 - 2

Dosen ökas stegvis, vanligtvis med 5 mg per vecka.

Vanligt dosintervall 5 - 20 mg x 1 alt. 5 - 10 mg x 2, max 40 mg/DYGN.

ADHD, tilläggbehandling till lisdexamfetamin (ej förstahandsval)

Barn 6 - 18 år: 5 - 10 mg x 1 alt. 5 mg x 2





Dexamfetamin oralt

(ex Attentin) tablett

ÖVRIG INFORMATION

Dexamfetamin används oftast som tillägg till långverkande läkemedel, det är inte ett förstahandsval vid ADHD.

Vikt och längd ska följas under behandling då centralstimulantia har förknippats med långsammare viktökning och minskad slutlängd.

De flesta barn med epilepsi kan behandlas med centralstimulantia, men i enstaka fall kan behandling med centralstimulantia ge en försämrad anfallskontroll.

Behandling ska inledas och övervakas av läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri, rättspsykiatri, neurologi eller barn- och ungdomsneurologi med habilitering eller av läkare med specialistkompetens som fått beviljad dispens från läkemedelsverket.



Dexamfetamin oralt (ex Attentin) tablett



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok Don't Rush to Crush. The Society of Hospital Pharmacists of Australia. Fourth edition, 2021.

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Farmakainstruktion - Kunskapsstöd för barn- och ungdomspsykiatrisk läkemedelsbehandling inom BUP Stockholm

<https://www.bup.se/om-oss/samarbeten-och-samverkan/for-dig-som-ar-vardgivare/>

Micromedex

PubMed PMID McCarthy S et al. Mortality associated with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) drug treatment: a retrospective cohort study of children, adolescents and young adults using the general practice research database. Drug Saf. 2009

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19810780>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnkardiologisk Förening - ADHD/centralstimulantia - råd & rekommendationer: Vårdprogram för barnkardiologisk övervakning vid läkemedelsbehandling av barn och ungdomar med ADHD

<https://sbkf.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri Riktlinje ADHD 2025

<https://slf.se/sfbup/riktlinjer/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 4855

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-03-31

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT