



Hydroxizin oralt

(ex Atarax) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 10 och 25 mg (ex Atarax)

Hydroxizin finns även som oral lösning, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Oralt: De flesta tabletter på 25 mg har en brytskåra som möjliggör att tablettens kan delas i två lika stora delar/doser. Dock kan det skilja sig mellan olika tillverkare, se respektive produktresumé.

Enteralt: Använd oral lösning, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Hydroxizin (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i originalförpackning i rumstemperatur. Enligt vissa tillverkare är tablettarna ljuskänsliga, se respektive produktresumé. Gäller båda styrkor och samtliga fabrikat.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas pga biverkningsrisk, se Övrig information.

Ångest och oro (ej förstahandsval)

Behandling bör inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Barn 5 - 12 år: 5 - 10 mg vid behov

Barn 13 - 18 år: 10 - 20 mg x 1 - 3

Maxdos

Barn under 40 kg: 2 mg/kg/DYGN

Barn från 40 kg: 100 mg/DYGN

Sömnstörning (rekommenderas inte, se Övrig information)

Behandlingen bör hanteras inom barn och ungdomspsykiatri och följas upp noggrant.

Barn 5 - 18 år: 10 - 25 mg x 1

Ges till natten.

Klåda och allergi (rekommenderas inte)

För hydroxizin finns godkänd indikation urtikaria och klåda för barn sedan lång tid tillbaka. Idag finns dock andra antihistaminer med mindre biverkningar och dessa rekommenderas istället för hydroxizin.





Hydroxizin oralt

(ex Atarax) tabletter

ÖVRIG INFORMATION

Risk för hangover-effekt och kvarstående sedering. Vid överdosering finns risk för varierande grad av medvetandesänkning, dock sällan djup medvetlöshet. Barn, särskilt yngre barn, kan reagera med CNS-excitation (oro, hallucinationer, muskelryckningar). Krampanfall har rapporterats mer frekvent för barn än för vuxna.

Hydroxizin kan ge förlängd QT-tid, speciellt vid höga doser eller vid kombination med andra QT-förlängande läkemedel.

Samtidigt intag av alkohol och centraldämpande medel förstärker den sedativa effekten och ska därför undvikas.

Hydroxizin saknar indikation för sömnstörningar hos barn och rekommenderas inte. Den kliniska effekten är begränsad samt det finns inget vetenskapligt stöd för behandling av sömnstörning hos barn.



Hydroxizin oralt

(ex Atarax) tabletter



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Farmakainstruktion 2025 Kunskapsstöd för barn- och ungdomspsykiatrisk läkemedelsbehandling inom BUP Stockholm

<https://www.bup.se/om-oss/samarbeten-och-samverkan/for-dig-som-ar-vardgivare/>

Internetadress Melatonin – behandling av sömnstörning hos barn

<https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/psykiskhalsa.4.728c0e316219da8135bd883.html>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje Depression, 2024

<https://sfbup.se/sfbup/app/uploads/2024/03/riktlinje-depression-webb.pdf>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neuroleptika vid vissa psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar

<https://lv.se/neuroleptikatillbarn>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn och ungdomar

<https://tinyurl.com/somnsvarigheterbarn>

Micromedex

PubMed PMID De Bruyne et al. Are antihistamines effective in children? A review of the evidence. Arch Dis Child. 2017

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27335428>

PubMed PMID Thunander Sundbom L et al. Sedativa antihistaminer – risk för allvarlig intoxication. Läkartidningen 2021

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34590703>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4857

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-03-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT