



Propiomazin oralt 25 mg

(ex Propavan) tablett

Risk för extrapyramidala symtom samt dagtrötthet.

ADMINISTRERING

Oralt:

För att underlätta nedsväljning kan tablettorna delas. Brytskåran är inte avsedd för att ge halva dosen.

Tabletten kan även krossas och slamas upp i vatten för omedelbar administrering.

Enteralt: Tabletten kan krossas och slamas upp i vatten för omedelbar administrering.

Tabletten ges 30 - 60 min före sänggåendet.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Propiomazin (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller samtliga fabrikat.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Långvarig insomni (3:e handsval)

Rekommenderas endast i undantagsfall. Endast för kortvarig behandling, där inga andra medel fungerat. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas.

Behandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatri.

Barn 13 - 18 år: 25 - 50 mg, ges 30 - 60 min före sänggåendet.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Farmakainstruktion 2023 - Kunskapsstöd för barn- och ungdomspsykiatrisk läkemedelsbehandling inom BUP Stockholm

<https://www.bup.se/494342/contentassets/c5b865fe86d44fbd957c9d71eaaeadbe/farmakainstruktion-bup-stockholm.pdf>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn och ungdomar

www.lakemedelsverket.se/somnstorning

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4863

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-01-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT