



Zopiklon oralt

(ex Imovane) tabletter

Risk för beroende samt dagtrötthet.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 5 och 7,5 mg (ex Imovane)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Tabletten ska administreras omedelbart före sänggående.

De flesta tabletter med styrkan 7,5 mg och brytskåra kan delas i två lika stora doser. Det kan dock skilja sig mellan olika tillverkare, se FASS. Tabletter med styrkan 5 mg saknar brytskåra.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Zopiklon (ex Imovane) (registrerad produkt)

5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C. Gäller även för styrkan 7,5 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Sömnstörningar (3:e handsval)

Rekommenderas endast i undantagsfall vid kortvarig behandling, mindre än 1 vecka, pga risk för beroende. Får aldrig ordineras vid misstanke om missbruksproblematik.

Behandling ska inledas och noggrant följas upp av specialist i barnpsykiatri.

Barn 12 - 18 år (efter puberteten): 5 (- 7,5) mg x 1, omedelbart före sänggående.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn och ungdomar

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandling-av-somnstorningar-hos-barn-och-ungdomar--kunskapsdokument>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-08-27

ePedID: 4866

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-08-27

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-08-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT