



Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt

(ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kombinationspreparat innehållande trimetoprim och sulfametoxazol, första styrkeangivelsen avser trimetoprim.

Tablett 80 + 400 mg (Bactrim)

Tablett 160 + 800 mg (Bactrim forte, Eusaprim forte)

ADMINISTRERING

Oralt:

Bactrim och Bactrim forte kan delas i två lika stora doser. Eusaprim forte ska endast delas för att underlätta nedsväljning.

Enteralt:

Användning av oral suspension rekommenderas, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Bactrim (registrerad produkt)

80 + 400 mg, Tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackning. Gäller även Bactrim forte.

Eusaprim Forte (registrerad produkt)

160 + 800 mg, Tablett

Förvaras vid högst 25 °C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Första dosangivelsen avser mängd trimetoprim.

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för trimetoprim och sulfametoxazol

Barn 6 - 12 år: 80/400 mg x 2

Barn 13 - 18 år: 160/800 mg x 2, max 240/1200 mg x 2

Denna dosering motsvarar ungefär 6 mg trimetoprim/kg/DYGN.

Behandlingstid: vanligen 10 dagar

Kattbett, vid penicillin-allergi

Barn 6 - 12 år: 80/400 mg x 2

Barn 13 - 18 år: 160/800 mg x 2

Behandlingstid: 10 dagar

Antibiotikaprofylax vid kirurgi

Engångsdos:

Barn 6 - 12 år: 80/400 mg

Barn 13 - 18 år: 160/800 mg

Dosen ges 2 - 10 timmar före hudincision.

Luftvägsinfektion vid cystisk fibros

Barn 6 - 12 år: 80/400 mg x 2

Barn 13 - 18 år: 160/800 mg x 2

Behandlingstid: vanligen minst 10 dagar

Profylax i samband med urologisk rekonstruktiv kirurgi eller invasiv urologisk diagnostik

Barn 6 - 12 år: 80/400 mg x 2

Barn 13 - 18 år: 160/800 mg x 2

Behandlingstid: vanligen tills några dagar efter kateterdragning





Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt

(ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Pneumocystis jiroveci pneumoni (PJP), behandling

Barn: 5 - 7 mg trimetoprim/kg x 3

Detta motsvarar ungefär följande dosering:

Barn 6 - 12 år: 160/800 mg x 3

Barn 13 - 18 år: 320/1600 mg x 3

Behandlingstid: Efter terapisvar bör nedtrappning av dos ske i samråd med infektionskonsult. Vanlig behandlingstid är 14 dagar.

Pneumocystis jiroveci pneumoni (PJP), profylax

Det finns olika doseringsstrategier för profylaxbehandling enligt följande:

A) Doseringsschema med dosering x 2, DAGLIGEN:

Barn 6 - 12 år: 40/200 mg x 2

Barn 13 - 18 år: 80/400 mg x 2

B) Doseringsschema med dosering x 2, TRE DAGAR per vecka

(i rad eller alternerande):

Barn 6 - 12 år: 40/200 mg x 2

Barn 13 - 18 år: 160/800 mg x 2

C) Doseringsschema med dosering x 1, TRE DAGAR I RAD per vecka:

Barn 6 - 12 år: 80/400 mg x 1

Barn 13 - 18 år: 160/800 mg x 1

D) Doseringsschema med dosering x 2, TVÅ DAGAR I RAD per vecka:

Barn 6 - 12 år: 80/400 mg x 2

Barn 13 - 18 år: 160/800 mg x 2

ÖVRIG INFORMATION

Behandling med sulfapreparat är kontraindicerat till barn under 6 veckor på grund av risk för undanträngning av bilirubin från plasmaalbumin. Bör endast användas om andra alternativ saknas. Stor försiktighet vid grav njurfunktionsnedsättning.





Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Kronoberg - Antibiotikaprofylax vid kirurgi (inklusive barndoseringar)

<https://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=33289>

Internetadress VGR, Alfresco - Antibiotikaprofylax barnurologiska ingrepp

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su9774-1570060579-339/surrogate/Antibiotikaprofylax-Barnurologiska%20ingrepp.pdf>

Internetadress VGR, Alfresco - Antibiotikaprofylax vid kirurgi

<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmellanarkiv-offentlig.vgregion.se%2Falfresco%2Fs%2Farchive%2Fstream%2Fpublic%2Fv1%2Fsource%2Favailable%2Fsofia%2Fs%2Fsu9805-1593997-1685%2Fnative%2FAntibiotikaprofylax%2520vid%2520kirurgi.docx&wd>

Internetadress VGR, Alfresco - Percutan endoskopisk gastrostomi - MIC introducer

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/SU9774-1570060579-412/SURROGATE/Percutan%20endoskopisk%20gastrostomi%20-%20MIC%20introducer.pdf>

Micromedex

Neonatal Formulary

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) Antibiotikakompedium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompedium/>

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4870

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4870

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-02-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT