



## Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL

spädning från Nezeril

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Spädning av endospipett 0,25 mg/mL (Nezeril).  
Används vid rest av licenspreparat med styrkan 0,1 mg/mL.

Alt. 2: Spädning av endospipett 0,5 mg/mL (Nezeril).  
Används vid rest av endospipett 0,25 mg/mL.

Alt. 3: Spädning av nässpray 0,25 mg/mL (Nezeril).  
Används vid rest av endospipetter 0,25 mg/mL samt 0,5 mg/mL.

### EN-STEGSSPÄDNING

#### Alt. 1 spädning av endospipett 0,25 mg/mL

Oximetazolin	NaCl 9 mg/mL		NÄSDR LÖ END
0,25 mg/mL		+	<b>0,125 mg/mL</b>
0,1 mL	0,1 mL	=	0,2 mL

#### Beredningsinstruktion:

Tillsätt 0,1 mL NaCl 9 mg/mL direkt i endosbehållaren med Nezeril 0,25 mg/mL alternativt töm endosbehållarens innehåll (0,1 mL) i en medicinkopp, tillsätt 0,1 mL NaCl 9 mg/mL och sug sedan upp blandningen i den tomma endospipetten och administrera från den.

### EN-STEGSSPÄDNING

#### Alt. 2 spädning av endospipett 0,5 mg/mL

Oximetazolin	NaCl 9 mg/mL		NÄSDR LÖ END
0,5 mg/mL		+	<b>0,125 mg/mL</b>
0,1 mL	0,3 mL	=	0,4 mL

#### Beredningsinstruktion:

Tillsätt 0,3 mL NaCl 9 mg/mL direkt i endosbehållaren med Nezeril 0,5 mg/mL alternativt töm endosbehållarens innehåll (0,1 mL) i en medicinkopp, tillsätt 0,3 mL NaCl 9 mg/mL och sug sedan upp blandningen i den tomma endospipetten och administrera från den.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Avsvällande vid nästäppa

Vanligen vid behov  
Nyfödda: 1 droppe i vardera näsborre  
Barn 1 - 6 mån: 1 - 2 droppar i vardera näsborre  
Barn 7 mån - 2 år: 2 - 4 droppar i vardera näsborre  
Kan ges max 3 gånger/dygn.

Används högst 7 dagar i rad, kan annars ge läkemedelsrelaterad nästäppa.

### ÖVRIG INFORMATION

Avsvällande näsdroppar till barn under 2 år saknar god evidens. Använd koksaltlösning i första hand.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress FDA - Biverkningsrapport

<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm325257.htm>

Internetadress Felleskatalogen - Rhinox, SPC

<https://www.felleskatalogen.no/medisin>

Internetadress Kinderformularium

<https://www.kinderformularium.nl>

Internetadress MHRA - Overview, Risk: benefit of OTC cough and cold medicines in children

<http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-p/documents/websiteresources/con041374.pdf>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Summary of Product Characteristics (SPC) Nasivin 0,1 mg/mL

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4872

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-10-12

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**





## Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL

spädning från Nezeril

### EN-STEGSSPÄDNING

#### Alt. 3 spädning av nässpray 0,25 mg/mL

Oximetazolin	NaCl 9 mg/mL		NÄSDR LÖ END
0,25 mg/mL	+	=	<b>0,125 mg/mL</b>
1 st	1 st		1 st

#### Beredningsinstruktion:

Tillsätt valfri mängd oximetazolin 0,25 mg/mL till en 1-mL spruta med kork från Nezeril nässpray genom att spraya ner i sprutan (spraya några gånger i luften innan för att fylla röret i Nezerilflaskan för att kunna vinkla sprayen och lättare spraya in i sprutan). Dra upp lika stor mängd NaCl 9 mg/mL i en annan spruta för att sedan att tillsätta i 1-mL sprutan med Nezeril.

### ADMINISTRERING

Nasalt: Administrera läkemedlet direkt från endosbehållaren alt. direkt från 1-mL sprutan.

Administreras 15 min innan måltid.

Innan användning av näsdropparna bör barnets näsa rengöras från snor.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Oximetazolin (registrerad produkt)

0,5 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

Öppnade endosbehållare ska förvaras i sitt innerkuvert i rumstemperatur.

Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara 3 månader. Öppnad endosbehållare sparas inte.

0,25 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

Öppnade endosbehållare ska förvaras i sitt innerkuvert i rumstemperatur.

Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara 3 månader. Öppnad endosbehållare sparas inte.

0,25 mg/mL, Nässpray, lösning

Förvaras i rumstemperatur med skyddshuven påsatt.

0,125 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

Får ej sparas, används direkt.