



## Kandesartan oralt

(ex Atacand) tabletter

Vid dehydrering/hypovolemi bör ARB\* tillfälligt sättas ut pga risk för förvärrad njursvikt och hyperkalemi.

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 4, 8, 16 och 32 mg (ex Atacand)

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

För att underlätta nedsväljning kan tablettorna krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering.

Enteralt i sond:

För att underlätta nedsväljning kan tablettorna krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering via sond.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

**Kandesartan (registrerad produkt)**

4 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller samtliga styrkor.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Hypertoni

Barn 1 - 5 år: Startdos 0,15 mg/kg x 1 (- 2), max 0,4 mg/kg/dygn

Barn 6 - 18 år och under 50 kg: Startdos 4 mg x 1, max 16 mg/dygn

Barn 6 - 18 år och från 50 kg: Startdos 8 mg x 1, max 32 mg/dygn

Viktigt att följa kaliumkoncentration och kreatinin, särskilt vid nyinsättning och dosökning.

### ÖVRIG INFORMATION

Angiotensin II-hämmare, ARB\* (t.ex. kandesartan) är kontraindicerade under graviditet och njurskadande på fostret sent i graviditeten. Det finns en ökad risk för njurskada om läkemedlet ges till prematurfödda barn.

Att fortsätta RAAS-blockad (renin-angiotensin-aldosteron-system-blockad) är värdefullt även vid avancerad njursvikt. Utvärdering av dos/effekt och biverkningar behövs kontinuerligt, men regelmässig dossänkning/utsättning vid en viss grad av njurfunktionsnedsättning rekommenderas inte.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID F. Schaefer et al. Efficacy, safety and pharmacokinetics of candesartan cilexetil in hypertensive children from 1 to less than 6 years of age

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20160654>

Rekommendation ,(Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>



## Kandesartan oralt (ex Atacand) tabletter



---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-11-19

ePedID: 4883

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-11-19

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-11-19

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**