



## Kandesartan oralt

(ex Atacand) tabletter

**Kontraindicerat för barn under 1 år, se Övrig information.**

**Vid dehydrering/hypovolemi bör kandesartan tillfälligt sättas ut pga risk för förvärrad njursvikt och hyperkalemi.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 4, 8, 16 och 32 mg (ex Atacand)

### ADMINISTRERING

Tabletter Atacand, Candesarstad, Candesartan Sandoz, Candexetil och Kandrozid har brytskåra och kan delas i två lika stora doser.

Tabletter Candesartan Krka har brytskåra, men kan endast delas för att underlätta nedsväljning.

För Candesartan Orion och Kairasec saknas information om brytskåra och delbarhet.

Oralt:

Vid sväljsvårigheter kan tabletterna krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

Enteralt:

Tablettorna kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Kandesartan (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller samtliga styrkor och tillverkare.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Hypertoni

Barn 1 - 5 år:

Startdos 0,15 mg/kg x 1 (- 2), kan höjas till max 0,4 mg/kg/DYGN

Barn 6 - 18 år, under 50 kg:

Startdos 4 mg x 1, kan höjas till max 16 mg/DOS

Barn 6 - 18 år, från 50 kg:

Startdos 8 mg x 1, kan höjas till max 32 mg/DOS

Viktigt att följa kaliumkoncentration och kreatinin, särskilt vid nyinsättning och dosökning.

### ÖVRIG INFORMATION

Angiotensin II-hämmare (ARB), t.ex. kandesartan, är kontraindicerade under graviditetens andra och tredje trimester pga teratogena egenskaper. Kandesartan är även kontraindicerat till barn under 1 år pga risk för negativa effekter på njurutvecklingen.

Att fortsätta RAAS-blockad (renin-angiotensin-aldosteron-system-blockad) är värdefullt även vid avancerad njursvikt. Utvärdering av dos/effekt och biverkningar behövs kontinuerligt, men regelmässig dossänkning/utsättning vid en viss grad av njurfunktionsnedsättning rekommenderas inte.





## Kandesartan oralt

(ex Atacand) tabletter

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

PubMed PMID Schaefer F et al. Efficacy, safety and pharmacokinetics of candesartan cilexetil in hypertensive children from 1 to less than 6 years of age

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20160654>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrolgisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4883

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2025-03-04

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**