



Oxikodon + Naloxon oralt

(ex Targiniq) depottabletter

Läkemedlet innehåller två aktiva substanser, varav den högre styrkan är oxikodon.

Flera tablettstyrkor finns.

Försiktighet vid leversvikt pga hög naloxondos.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Depottabletter (ex Targiniq) innehållande oxikodon + naloxon, varav den högre styrkan är oxikodon:
5 + 2,5 mg
10 + 5 mg
20 + 10 mg
40 + 20 mg

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Depottabletterna måste sväljas hela och får inte delas, krossas eller tuggas.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Targiniq (registrerad produkt)

1 st, Depottablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Gäller samtliga styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Smärta och profylax mot opioidinducerad förstoppning

Doserna nedan avser mängden oxikodon.

I första hand ska oxikodon och naloxon ordinerars som separata läkemedel. Kombinationspreparat som ex Targiniq kan användas i undantagsfall och ska ordinerars i samråd med smärtläkare.

Barn: 0,1 - 0,2 mg/kg x 2

Alternativt (fast dosering)

Barn 8 - 11 år: 5 mg x 2

Barn 12 - 18 år: 10 mg x 2

ÖVRIG INFORMATION

Administrering och dosering ska individualiseras, hänsyn bör tas till smärtans natur och svårighetsgrad samt patientens allmäntillstånd.

Vid övergång från intravenös till peroral administrering av oxikodon bör dygnsdosen höjas 1,3 - 2 gånger pga lägre biotillgänglighet. Biotillgängligheten efter oral administrering är ca 87 % för oxikodon.

Biotillgängligheten för naloxon efter oral administrering är under 3 % och ger därmed endast lokal effekt i tarmen (motverkar opioidinducerad förstoppning).

Vid utsättande efter 6 dygns opioidbehandling bör dosen successivt reduceras. Initial dosminskning med 20 - 40 %, därefter gradvis med 10 - 20 % under ca 5 dygn.

Oxikodon är en opioid med effekt även på kappa-receptorn. Kappa-receptorer finns perifert i bukorganen och oxikodon kan ha en fördel vid behandling av visceral smärta jämfört med övriga opioider.



Oxikodon + Naloxon oralt (ex Targiniq) depottabletter



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Micromedex

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-05-09

ePedID: 4889

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-05-23

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-05-23

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT