



## Oxikodon + Naloxon oralt

(ex Targiniq) depottabletter

Läkemedlet innehåller två aktiva substanser, den högre styrkan avser oxikodon.

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Depottabletter (ex Targiniq) innehållande oxikodon + naloxon, den högre styrkan avser oxikodon:

5 + 2,5 mg

10 + 5 mg

20 + 10 mg

40 + 20 mg

### ADMINISTRERING

Oralt: Depottabletterna måste sväljas hela och får inte delas, krossas eller tuggas.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Oxikodon + naloxon (registrerad produkt)

Depottablett

Förvaras vid högst 25 °C. Gäller samtliga styrkor.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Smärta och profylax mot opioidinducerad förstoppning

I första hand ska oxikodon och naloxon ordineras som separata läkemedel. Kombinationspreparat (ex Targiniq) kan användas i undantagsfall.

Bör endast förskrivas av läkare med kompetens gällande barn och smärta, exempelvis specialistläkare inom smärtlindring, barnonkologi eller palliativ medicin.

Dygnsdosen anpassas individuellt och bör provas ut med hjälp av korttidsverkande beredning. Vid genombrottssmärta bör vid behovsdos ges i form av korttidsverkande beredning, tablett alternativt oral lösning. För dosering av korttidsverkande beredning, se annan instruktion.



## Oxikodon + Naloxon oralt (ex Targiniq) depottabletter



### ÖVRIG INFORMATION

Oxikodon är en opioid med effekt även på kappa-receptorn. Kappa-receptorer finns perifert i bukorganen och oxikodon kan ha en fördel vid behandling av visceral smärta jämfört med övriga opioider.

Administrering och dosering ska individualiseras, hänsyn bör tas till smärtans natur och svårighetsgrad samt patientens allmäntillstånd. Det är viktigt att optimera doseringen vid behandling av akut smärta. Tre till fem dagars behandling är ofta tillräckligt.

Vid övergång från intravenös till oral administrering bör dygnsdosen höjas 1,3 - 2 gånger på grund av lägre biotillgänglighet (ca 60 - 80 % biotillgänglighet).

Vid utsättande efter mer än 5 dygns opioidbehandling bör dosen successivt minskas. Uttrappning sker långsamt, som tumregel under minst lika lång tid som opioider används. Initial dosminskning rekommenderas med 20 - 40 % stegvis inom några dygn, därefter gradvis dosminskning med 10 - 20 % per dygn under ca 5 dygn i slutet av uttrappningen. Dosminskningen bör ta hänsyn till individuella faktorer, hur lång tid opioidbehandlingen har pågått och förutsätter att patienten ej har smärta. Förslag till nedtrappning vid långtidsanvändning (mer än 90 dagar) finns på Janusinfo, se Referenser.

Biotillgängligheten för naloxon efter oral administrering är mindre än 3 % och ger därmed endast lokal effekt i tarmen (motverkar opioidinducerad förstoppning).

Antidot: naloxon



## Oxikodon + Naloxon oralt (ex Targiniq) depottabletter



### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

ePed Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress SFBABI - Riktlinjer för smärtbehandling hos barn, Akut och postoperativ smärta

<https://sfai.se/riktlinje/riktlinjetrad/>

Janusinfo Rekommendationer för utsättning av opioider

<https://www.janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/smartaochreumatologiskasjukdomar>

Micromedex

PubMed PMID Kinnunen M et al. Updated Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Oxycodone. Clin Pharmacokinet. 2019 Jun;58(6):705-725.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30652261>

PubMed PMID Thigpen JC, Odle BL, Harirforoosh S. Opioids: A Review of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in Neonates, Infants, and Children. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2019

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31006834>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 4889

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2025-10-29

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**