



# Karayagummi oralt

(Inolaxol)

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Granulat, dospåse (Inolaxol)

Karayagummi heter sterculia på engelska.

## ADMINISTRERING

Oralt: blandas med ca 15 - 30 mL vatten eller annan dryck. Det kan också blandas med flytande föda.

Viktigt att ett extra glas vätska intas i samband med administreringen.

Ska ej tas precis innan sänggående.

Enteralt: rekommenderas INTE då det finns risk för ocklusion eftersom granulatet sväller vid kontakt med vätska.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Inolaxol (registrerad produkt)

Granulat, dospåse

Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad påse kan förvaras i skydd för fukt i högst 1 vecka.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Förstoppning

Barn 2 - 6 år: 0,5 dospåse x 1 - 2

Barn 7 - 18 år: 1 dospåse x 1 - 2

### Tilläggsbehandling vid IBS (både förstoppning och diarré)

Barn 7 - 18 år: 1 dospåse x 2

## ÖVRIG INFORMATION

Karayagummi är ett bulkmedel. Viktigt med vätskeintag under behandlingen.

## REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarforeningen Regionalt vårdprogram Stockholms läns landsting  
Smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar

<https://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/>

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4894

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2024-11-26

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**