



Terbinafin utvärtes 1 %

(ex Lamisil) kräm

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kräm 1 % = 10 mg/gram (ex Lamisil)

ADMINISTRERING

Kutant: Krämen masseras in på och omkring angripet område. Huden ska vara ren och torr.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Terbinafin (registrerad produkt)

1 %, Kräm

Förvaras i rumstemperatur. Tillslut tuben väl. För infektionskänslig patient är öppnad tub hållbar 1 mån, till övriga 3 - 6 mån, se respektive produktresumé för produktspecifika uppgifter.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Svampinfektion i huden

Barn: appliceras 1 - 2 gånger dagligen

Behandlingstid: vanligen 1 - 2 veckor beroende på typ av svamp

ÖVRIG INFORMATION

Krämen innehåller bensylalkohol, ca 10 mg/gram, som kan orsaka allergisk reaktion och/eller mild lokal irritation. Även andra hjälpämnen i krämen kan orsaka lokala hudreaktioner.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

Rekommendation , (Grade 1B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4900

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-11-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT