



Loperamid oralt 2 mg

(ex Dimor) kapsel/tabletter

Risk för tillvänjning vid långvarig behandling.

Risk för CNS-depression, andningsdepression och hjärtrytmrubbningar vid överdosering.

Kontraindicerat till barn under 2 år.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel hård (ex Loperamid Viatris)
Tablett (ex Dimor)
Munsönderfallande tablett (Imodium)
Frystorkad tablett (Loritax)

ADMINISTRERING

Munsönderfallande tabletter och frystorkade tabletter är spröda och får därför inte delas eller tryckas genom folien. De ska tas ur blisterkartorna genom att dra av aluminiumhöljet.

Dimor tablett kan delas i undantagsfall, men då den saknar skåra rekommenderas användning av tablettedlare. Övriga tabletter kan inte delas eller saknar information om delbarhet.

Oralt:

Munsönderfallande tabletter och frystorkade tabletter ska placeras på tungan där de löses upp och sväljs. Inget extra vätskeintag är nödvändigt.

Vanliga tabletter sväljs med en mindre mängd vätska alternativt krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

Enteralt:

Kapslarna kan öppnas och innehållet slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen. Munsönderfallande tabletter och frystorkade tabletter kan lösas upp i lite vatten i direkt anslutning till administreringen.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kontraindicerat till barn under 2 år. Endast undantagsvis för barn under 12 år, se Övrig information. Behandlingsindikation hos barn under 12 år bör diskuteras med barnläkare med gastroenterologisk kompetens.

Behandla så kort tid som möjligt. Om ingen klinisk effekt har noterats inom 2 dygn ska behandlingen avslutas och läkare kontaktas.

Akuta ospecifika diarréer, symtomatisk behandling

Dosera efter vikt om barnet väger MINDRE än angivet intervall för barnets ålder. Minst 2 - 3 tim mellan doserna.

Barn 2 - 5 år (13 - 20 kg): Inledningsvis 1 mg, därefter 1 mg efter varje diarré. Max 3 mg/DYGN, i max 3 dygn.

Barn 6 - 8 år (21 - 26 kg): Inledningsvis 2 mg, därefter 1 mg efter varje diarré. Max 4 mg/DYGN, i max 3 dygn.

Barn 9 - 11 år (27 - 43 kg): Inledningsvis 2 mg, därefter 1 mg efter varje diarré. Max 6 mg/DYGN, i max 5 dygn.

Barn 12 - 18 år (från 44 kg): Inledningsvis 4 mg, därefter 2 mg efter varje diarré. Max 16 mg/DYGN, i max 5 dygn.

ÖVRIG INFORMATION

Bör användas i lägsta möjliga dos och behandlingstid för att minimera risken för biverkningar.

Bör ej kombineras med andra läkemedel som kan ge förlängd QT-tid. Barn har en högre känslighet än vuxna för loperamids CNS-deprimerande effekt, dess kardiella toxicitet samt ökad risk för andningsdepression.

Bör användas med stor försiktighet till barn med nedsatt leverfunktion.





Loperamid oralt 2 mg

(ex Dimor) kapsel/tabletter

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Loperamid (registrerad produkt)

2 mg, Tablett

Förvaras vid högst 25 °C.

2 mg, Munsönderfallande tablett

Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

2 mg, Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C.

2 mg, Frystorkad tablett

Förvaras vid högst 25 °C.

REFERENS/LÄNK

Artikel Läkartidningen - Livsfarligt missbruk av receptfria diarréläkemedlet loperamid. Myllymäki et al 2020

<https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/fallbeskrivning/2020/01/livsfarligt-missbruk-av-receptfria-diarrlakemedlet-loperamid/>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4905

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-01-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT