



## Propylenglykol utvärtes 20 %

(ex Propyderm) kräm/emulsion

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kräm 20 % (ex Propyderm)  
Kutan emulsion 200 mg/g\* (ex Propyless)  
Propylenglykol i Essex kräm 20 % (extempore)  
Propylenglykol i Decubal kräm 20 % (extempore)  
Propylenglykol i Locobase kräm 20 % (extempore)  
Propylenglykol i Locobase kutan emulsion 20 % (extempore)

\*200 mg/g motsvarar 20 % propylenglykol

### ADMINISTRERING

Utvärtes: Smörjes vid behov. Applicera efter kontakt med vatten.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Propylenglykol (registrerad produkt)

Kräm

Förvaras i rumstemperatur. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter öppnad förpackning, annars 6 mån.

Kutan emulsion

Burk förvaras vid högst 30 °C, tub förvaras vid högst 25 °C. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter öppnad förpackning, annars 6 mån.

#### Propylenglykol APL (extempore)

Kräm

Förvaras i rumstemperatur. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter öppnad förpackning, annars 6 mån. Gäller även kutan emulsion.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

**Torr hud**

Smörjes vid behov.

### ÖVRIG INFORMATION

Applicera inte propylenglykol på brännskadad hud.

Spädbarn och nyfödda är mer känsliga än vuxna för absorption av propylenglykol via huden. Toxiska reaktioner finns rapporterat vid administrering av stora mängder propylenglykol.

Propylenglykol kan vara ototoxiskt, applicera därför ej i hörselgångarna.

### REFERENS/LÄNK

APL databas (AIDA)

<https://www.apl.se>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4908

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-09-15

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**