



Isoniazid intravenös inj 50 mg/mL

(Extempore)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Injektionsvätska 50 mg/mL, spädes ej (extempore)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion (3 - 5 min)

RIMLIG DOS för Isoniazid intravenös inj 50 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	-	-	-	5 mL
10 mg/kg	-	1 mL	2 mL	-

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Isoniazid (extempore)

50 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Öppnad flaska: förvaras i rumstemperatur. Efter första uttag: 12 tim i rumstemperatur, 24 tim i kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Tuberkulös meningit

Ges i kombination med andra tuberkulosläkemedel.

Nyfödda: 10 - 20 mg/kg x 1

Barn upp till 25 kg: 10 - 20 mg/kg x 1, max 500 mg x 1

Barn över 25 kg: 5 mg/kg x 1, max 300 mg x 1

Behandlingstid: 12 mån

ÖVRIG INFORMATION

Som profylax mot isoniazid-inducerad neuropati ges pyridoxin.

REFERENS/LÄNK

Bok Starke J R et al. 2016. Handbook of Child & Adolescent Tuberculosis. Oxford University Press Inc. Första upplagan.

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier
<http://www.apl.se>

Internetadress WHO - Guidelines on tuberculosis
<https://www.who.int/publications/guidelines/tuberculosis/en/>

Internetadress Vårdprogram CNS-infektioner, bakteriella
<https://infektion.net/varprogram/cns-infektioner-bakteriella/>

PubMed PMID B D Daniel et al. Tuberculous meningitis in children: Clinical management & outcome
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31670267>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-10-27

ePedID: 4909

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-11-10

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-11-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT