



DOBUTamin intravenös inf 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL

Förväxlingsrisk med DOPamin.

Anestesi- och intensivvårdsläkemedel, kontinuerlig blodtrycks- och EKG-övervakning krävs.

EN-STEGSSPÄDNING

Dobutamin		NaCl 9 mg/mL alt		INF
12,5 mg/mL	+	Glukos 50 eller 100 mg/mL	=	0,5 mg/mL
2 mL		48 mL		50 mL

Beredningsinstruktion:

Har dobutamin förvarats ljusskyddat kan ampuller/påsar användas även om färgen på lösningen är rosa.

ADMINISTRERING

Intravenös infusion (kontinuerlig): Ges i första hand i central infart, men kan även ges i stor perifer ven.

RIMLIG DOS för DOBUTamin intravenös inf 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mikrog/kg/min	0,6 mL/tim	3 mL/tim	6 mL/tim	30 mL/tim
10 mikrog/kg/min	1,2 mL/tim	6 mL/tim	12 mL/tim	60 mL/tim

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Dobutamin (registrerad produkt)

12,5 mg/mL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Bruten ampull får ej sparas, används direkt.

0,5 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Efter iordningställande: hållbar 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens

Hållbarhetsinformation.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kontinuerlig blodtrycks- och EKG-övervakning krävs.

Hypovolemi bör korrigeras innan behandling. Följ urinflödet.

Behov av inotrop cirkulationsstöd

Nyfödda:

Vanlig startdos: 5 mikrog/kg/min

Titreras upp i steg om 2,5 - 5 mikrog/kg/min.

Underhållsdos: 2,5 - 10 (- 20) mikrog/kg/min

Barn 1 mån - 18 år:

Vanlig startdos: 5 mikrog/kg/min

Titreras upp i steg om 2,5 - 5 mikrog/kg/min.

Underhållsdos: 2,5 - 10 (- 20) mikrog/kg/min

ÖVRIG INFORMATION

Dosen av dobutamin måste gradvis reduceras innan behandlingen avbryts.

Behandlingens längd, som beror på det kliniska tillståndet, ska vara så kort som möjligt.

Om dobutamin administreras kontinuerligt under mer än 72 timmar kan tolerans uppstå, vilket kräver att dosen höjs.

Dobutamin har troligtvis smalare terapeutiskt fönster hos barn än hos vuxna.



DOBUTamin intravenös inf 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL

REFERENS/LÄNK

Artikel Gian Maria Pacifici. Clinical Pharmacology of Dobutamine in Infants and Children. Clinical Research Notes, 2021.
<https://www.auctoresonline.org/article/clinical-pharmacology-of-dobutamine-in-infants-and-children>
BNF-C
<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>
FASS
<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>
Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation
<http://eped.se/hallbarhet/>
PubMed PMID Cavigelli-Brunner A et al. Prevention of low cardiac output syndrome after pediatric cardiac surgery: a doubleblind randomized clinical pilot study comparing dobutamine and milrinone
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29538053>
PubMed PMID Dempsey E, Rabe H, The Use of Cardiotonic Drugs in Neonates. Clin Perinatol, 2019, 46(2), 273-290
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31010560>
PubMed PMID Hamdallah Ashkar et al. Dobutamine. StatPearls, Feb 2024.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29262042>
Rekommendation , (Grade 2B)
<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Nivin Asinger	ePedID: 4911
Fastställare/läkare: Christiane Garnemark	Versionsnummer, major: 2
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt	Giltig fr o m: 2025-04-28

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT