



Parecoxib intravenös inf/inj 4 mg/mL

(Dynastat)

Försiktighet vid nedsatt njur- eller leverfunktion, gastroenterit och långvarig feber.

EN-STEGSSPÄDNING

Dynastat		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50		INJ-INF LÖ
40 mg		mg/mL		4 mg/mL
1 st	+	10 mL	=	10 mL

Beredningsinstruktion:

Observera att 10 mL spädningsvätska inte får plats i injektionsflaskan med pulver. Lösningen iordningställs genom att först försiktigt tillsätta ungefär hälften av spädningsvätskan till flaskan med pulver, snurra flaskan försiktigt för att lösa upp pulvret. När pulvret är upplöst dras lösningen tillbaka till resten av spädningsvätskan i sprutan och blandas där till en homogen lösning.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion/infusion

RIMLIG DOS för Parecoxib intravenös inf/inj 4 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,4 mg/kg	-	-	1 mL	5 mL
0,5 mg/kg	-	-	1,25 mL	6,25 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Dynastat (registrerad produkt)

40 mg, Pulver till injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

4 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Hållbar i 12 tim vid högst 25 °C. Får inte kylas eller frysas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Smärta, korttidsbehandling (inkl postoperativ smärta)

Barn 1 - 18 år: (0,4 -) 0,5 mg/kg x 1 (- 2), max 80 mg/DYGN

Ibuprofen infusionsvätska kan vara alternativ till mindre barn.

Vid övergång från parecoxib till per oral behandling med NSAID (t.ex. ibuprofen, celecoxib), bör per oral behandling påbörjas 10 - 12 tim efter sista dosen parecoxib.

ÖVRIG INFORMATION

Parecoxib är en selektiv COX-2 hämmare.

Försiktighet vid nedsatt njur- och leverfunktion, gastroenterit, långvarig feber, varicella zosterinfektion, hjärtsvikt och antikoagulationsbehandling. Bör inte administreras samtidigt med andra nefrotoxiska läkemedel.

Selektiva COX-2 hämmare orsakar mindre GI-blödningar än andra NSAID-läkemedel.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress VGR, Alfresco - Tonsillotomi-tonsillektomi barn anestesirutin

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/21036/Tonsillotomi-tonsillektomi%20barn%20anestesirutin.pdf?a=false&guest=true>

Micromedex

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4920



Parecoxib intravenös inf/inj 4 mg/mL (Dynastat)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-11-26
Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-12-02
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4920
Versionsnummer, major: 2
Giltig fr o m: 2020-12-02

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT