



Metylnaltrexonbromid subkutan inj 20 mg/mL

(Relistor 12 mg/0,6 mL)

INGEN SPÄDNING

INJ LÖ
20 mg/mL
0,6 mL

ADMINISTRERING

Subkutan injektion: i låren, buken eller överarmarna.

RIMLIG DOS för Metylnaltrexonbromid subkutan inj 20 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,075 mg/kg	-	-	0,04 mL	0,19 mL
0,15 mg/kg	-	-	0,08 mL	0,38 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Metylnaltrexonbromid (registrerad produkt)

20 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Överbliven lösning uppdragen i injektionsspruta bör användas inom 24 tim, ljuskänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Opioidinducerad förstoppning

Metylnaltrexonbromid kan vara aktuellt när oral behandling inte är lämplig.

Laxantia bör alltid ordinerars vid längre opioidbehandling än 3 dygn.

Barn 3 - 18 år:

Startdos (de första 1 - 2 doserna): 0,05 - 0,075 mg/kg

Underhållsdos: vanligen 0,15 mg/kg VARANNAN dag, max 12 mg/DOS

ÖVRIG INFORMATION

Vanliga biverkningar är koliksmärtor, buksmärtor, illamående, diarré och flatulens.

För att minimera risken för koliksmärtor bör den lägre dosen ges de första 1 - 2 doserna.

I nuläget finns det få studier som inkluderar yngre barn.





Metylnaltrexonbromid subkutan inj 20 mg/mL

(Relistor 12 mg/0,6 mL)

REFERENS/LÄNK

ePed Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Flerlage JE, Baker JN. Metylnaltrexone for Opioid-Induced Constipation in Children and Adolescents and Young Adults with Progressive Incurable Cancer at the End of Life.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25927665>

PubMed PMID Novak C et al. Peripherally acting μ -opioid receptor antagonists for treatment of opioid-induced constipation in children. Paediatr Child Health. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33747318>

PubMed PMID Raschka M. et al. Clinical Outcomes of Intravenous Metylnaltrexone in Children: A Single-Arm Retrospective Cohort Study. J Pediatr Pharmacol Ther. 2024

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38863861>

PubMed PMID Rodrigues A et al. Metylnaltrexone for opioid-induced constipation in pediatric oncology patients

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23766091>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4925

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-08-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT