



Adalimumab subkutan inj

(ex Amgevita, Humira)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Referensläkemedel:

Humira 20 mg/0,2 mL, 40 mg/0,4 mL och 80 mg/0,8 mL

Biosimilarer:

Amgevita 20 mg/0,8 mL, 40 mg /0,8 mL

Hulio, Hyrimoz, Idacio och Imraldi 40 mg/0,8 mL

Citratfria produkter är: Amgevita, Hulio och Humira, se Övrig information

ADMINISTRERING

Subkutan injektion: Tillgängliga som förfylld penna och förfylld spruta

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Adalimumab (registrerad produkt)

Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Förvaras i ytterförpackningen, ljuskänsligt. Pennan kan förvaras i rumstemperatur, hållbarhetstiden varierar beroende på vald produkt, läs bipacksedeln för korrekt förvaringsinstruktion. Skyddas från ljus.

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Förvaras i ytterförpackningen, ljuskänsligt. Sprutan kan förvaras i rumstemperatur, hållbarhetstiden varierar beroende på vald produkt, läs bipacksedeln för korrekt förvaringsinstruktion. Skyddas från ljus.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandlingen initieras av eller i samråd med en specialist

Crohns sjukdom

Doseras vanligen varannan vecka

Barn 6 - 18 år:

Induktionsbehandling

Barn under 40 kg:

Dag 1: 40 mg

Dag 15: 20 mg

Alternativt när snabbare behandlingssvar önskas (risk för ökade biverkningar):

Dag 1: 80 mg

Dag 15: 40 mg

Barn från 40 kg:

Dag 1: 80 mg

Dag 15 : 40 mg

Alternativt när snabbare behandlingssvar önskas (risk för ökade biverkningar):

Dag 1: 160 mg

Dag 15: 80 mg

Underhållsbehandling, med start dag 29

Barn under 40 kg:

20 mg varannan vecka, alternativt vid otillräckligt terapisvar 20 mg varje vecka

Barn från 40 kg:

40 mg varannan vecka, alternativt vid otillräckligt terapisvar 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka

Adalimumab subkutan inj

(ex Amgevita, Humira)



VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ulcerös kolit

Barn 5 - 18 år

Induktionsbehandling

Barn 20 - 39 kg:

Dag 1: 80 mg

Dag 8: 40 mg

Dag 15: 40 mg

Barn från 40 kg:

Dag 1: 160 mg (kan delas på två dagar)

Dag 8: 80 mg

Dag 15: 80 mg

Underhållsbehandling med start dag 29

Barn 20 - 39 kg:

40 mg varannan vecka alternativt 20 mg varje vecka

Barn från 40 kg:

80 mg varannan vecka alternativt 40 mg varje vecka

Juvenil idiopatisk artrit

Barn 2 - 18 år:

Barn 10 - 14 kg: 10 mg varannan vecka

Barn 15 - 29 kg: 20 mg varannan vecka

Barn från 30 kg: 40 mg varannan vecka

Kliniskt svar erhålls vanligen inom 12 veckors behandling. Överväg utsättning om kliniskt svar saknas inom detta tidsintervall.

Adalimumab subkutan inj

(ex Amgevita, Humira)



VANLIG INDIKATION OCH DOS

Plackpsoriasis

Barn 4 - 18 år

Barn 15 - 29 kg:

Dag 1: 20 mg

Dag 8: 20 mg

Därefter 20 mg varannan vecka

Barn från 30 kg:

Dag 1: 40 mg

Dag 8: 40 mg

Därefter 40 mg varannan vecka

Kliniskt svar erhålls vanligen inom 16 veckors behandling. Överväg utsättning om kliniskt svar saknas inom detta tidsintervall.

ÖVRIG INFORMATION

Amgevitas penna har en annan konstruktion än Humira, instruktionsfilm finns på www.medicininstruktioner.se

Samtliga biosimilarer har en volym på 0,8 mL för båda spruta och penna jämfört med referensläkemedlet som har en volym på 0,4 mL för båda spruta och penna i styrka 40 mg.

Citratfria produkter tenderar att ha mindre biverkningar i form av instickssmärta.

Behandling med TNF antagonister bör inte påbörjas under pågående infektion.

Behandling med TNF antagonist bör avbrytas om en ny allvarlig infektion eller sepsis utvecklas under behandlingen.



Adalimumab subkutan inj (ex Amgevita, Humira)



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Medicininstruktioner

<https://www.medicininstruktioner.se/>

Micromedex

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4934

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani 2021-07-02

ePedID: 4934

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-07-02

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-07-02

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT