



Adalimumab subkutan inj

(ex Hyrimoz, Humira)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Injektionsvätska lösning i förfylld spruta eller injektionspenna, se resp. produkt.

Referensläkemedel:

Humira 20 mg/0,2 mL, 40 mg/0,4 mL och 80 mg/0,8 mL

Biosimilarer:

Hyrimoz: 20 mg/0,2 mL, 40 mg/0,4 mL och 80 mg/0,8 mL

Hukyndra: 40 mg/0,4 mL, 80 mg/0,8 mL

Amgevita: 20 mg/0,2 mL, 20 mg/0,4 mL, 40 mg/0,4 mL och 40 mg/0,8 mL

Imraldi: 40 mg/0,4 mL

Idacio: 40 mg/0,8 mL

Hulio: 40 mg/0,8 mL

Yuflyma: 40 mg/0,4 mL, 80 mg/0,8 mL

Syrafria produkter: Humira, Hulio, Hukyndra.

För syrainnehållande produkter, se Övrig information.

Citratfria produkter: Hyrimoz, Hukyndra, Amgevita, Hulio, Imraldi, Yuflyma och Humira, se Övrig information.

ADMINISTRERING

Subkutan injektion

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Adalimumab (registrerad produkt)

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Förvaras i kylskåp, i ytterförpackningen. Ljuskänsligt. Sprutan kan förvaras i rumstemperatur, hållbarhetstiden varierar beroende på vald produkt, se bipacksedel för korrekt information. Gäller även injektionspenna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandlingen initieras av eller i samråd med specialtläkare inom gastroenterologi eller reumatologi.

Behandling med TNF-antagonister bör inte påbörjas under pågående infektion. Pågående behandling bör avbrytas om en ny allvarlig infektion eller sepsis utvecklas under behandlingen.

Crohns sjukdom

Barn 6 - 18 år

Barn under 40 kg: Dag 1: 80 mg x 1

Dag 15: 40 mg x 1

Därefter 20 mg VARANNAN vecka

Barn från 40 kg: Dag 1: 160 mg x 1

Dag 15: 80 mg x 1

Därefter 40 mg VARANNAN vecka

Ulcerös kolit

Barn 5 - 18 år

Barn under 40 kg: Startdos: 80 mg x 1

Därefter 40 mg VARANNAN vecka

Barn från 40 kg: Startdos: 160 mg x 1

Därefter 80 mg VARANNAN vecka

Juvenil idiopatisk artrit

Barn 2 - 18 år:

Barn 10 - 29 kg: 20 mg VARANNAN vecka

Barn från 30 kg: 40 mg VARANNAN vecka

Kliniskt svar erhålls vanligen inom 12 veckors behandling. Överväg utsättning om kliniskt svar saknas inom detta tidsintervall.





Adalimumab subkutan inj

(ex Hyrimoz, Humira)

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Plackpsoriasis

Barn 4 - 18 år

Barn 15 - 29 kg: Dag 1: 20 mg

Dag 8: 20 mg

Därefter 20 mg VARANNAN vecka

Barn från 30 kg: Dag 1: 40 mg

Dag 8: 40 mg

Därefter 40 mg VARANNAN vecka

Kliniskt svar erhålls vanligen inom 16 veckors behandling. Överväg utsättning om kliniskt svar saknas inom detta tidsintervall.





Adalimumab subkutan inj

(ex Hyrimoz, Humira)

ÖVRIG INFORMATION

Inför behandlingsstart rekommenderas följande undersökningar och kontroller:

- Lungröntgen
- Tuberkulostest (PPD eller IGRA-test (Quantiferontest))
- Hepatit B med analys av (HBsAg och anti-HBc) och hepatit C med analys av antiHVC
- Överväg MR-undersökning vid fistulerande sjukdom för att utesluta abscess
- Överväg endoskopi för att utesluta förekomst av intestinal komplikation (striktur eller fistel)

För att minimera utvecklingen av antikroppar ska adalimumab kombineras med annat icke biologiskt, immunsuppressivt läkemedel.

Biosimilarernas förfyllda pennor har en annan konstruktion än referensläkemedlet Humira. Instruktionsfilmer finns, se referens Medicininstruktioner.

Citratfria produkter samt produkter med lägre volym tenderar att ge mindre instickssmärta.

Syrainnehållande produkter: Hyrimoz: Adipinsyra
Amgevita: Isättika
Imraldi: Bärnstenssyra
Idacio: Citronsyramonohydrat samt natriumcitrat
Yuflyma: Ättiksyra





Adalimumab subkutan inj (ex Hyrimoz, Humira)

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Medicininstruktioner

<https://www.medicininstruktioner.se/>

Micromedex

PubMed PMID Strik AS et al. Suppression of anti-drug antibodies to infliximab or adalimumab with the addition of an immunomodulator in patients with inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2017.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28230306>

PubMed PMID Van Rheenen et al. The Medical Management of Paediatric Crohn's Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. J Crohns Colitis. 2021.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33026087>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnreumatologisk Förening - Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA)

<https://reuma.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - IBD inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4934

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa Akkawi El-Edelbi

ePedID: 4934

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-02-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT